

*Шавейко Т. В.*

## **РАК ТОЛСТОЙ КИШКИ В СОСТАВЕ ПЕРВИЧНЫХ МНОЖЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ**

*Научные руководители канд. мед. наук, доц. Каравай А. В.*

*Кафедра онкологии*

*Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно*

**Актуальность.** Рак толстого кишечника занимает 4 место в общей структуре онкологических заболеваний и 2 место среди всех первичных опухолей. Летальность составляет 10,8%, смертность 14,1 на 100000 населения.

**Цель:** охарактеризовать заболеваемость раком толстой кишки с локализацией в правых отделах в составе первичных множественных новообразований в Гродненской области в период с 2008 до 2018.

**Материалы и методы.** Ретроспективный анализ 197 амбулаторных карт пациентов со злокачественными новообразованиями толстой кишки правых локализаций в составе первичных множественных новообразований.

**Результаты и их обсуждение.** Рак правых отделов толстого кишечника выявляется в 51% у женщин и в 49% у мужчин, 68% городского населения и 32% сельского. В 28,9% случаев рак локализовался в слепой кишке, в 22,8% - восходящей ободочной кишке, в 18,3% - в печёночном изгибе. Гистологически тубулярная аденокарцинома в 53,8% случаев, аденокарцинома в 26,7% случаев. Вторая опухоль локализовалась в коже в 46 (23,3%) случаях, теле матки – 20 (10,1%) случаях, предстательной железе – 17 (8,6%) случаях, почке – 13 (6,5%) случаях, молочной железе – 11 (5,5%) случаях, желудке – 10 (5,0%) случаях. В 22,3% случаев рак толстой кишки был синхронной опухолью, в 77,7% случаев был метакронной опухолью. Вторая опухоль была выявлена на первой стадии в 57,0% случаев, на второй стадии в 16,2% случаев, на третьей – 22,5% случаев, на четвёртой – 4,1% случаев. Всего умерло 77(39,0%) человека, из них 54(70%) пациента умерли от рака правых отделов толстого кишечника, 29 (37%) от других заболеваний и 4 (5,1%) от осложнений лечения. Продолжительность жизни до года составила 77 человек (100%), один год -30 человек (38,9%), два года -13 человек (16,8%), 3 года – 6 человек (7,7%), 4 года – 5 человек (6,4%), 5 лет – 3 человека (3,8%), 6 лет -1 человек (1,3%).

**Выводы.** Рак правых отделов толстого кишечника одинаково часто выявляется у обоих полов, преимущественно городского населения, чаще метакронная опухоль. По локализации в слепой кишке и восходящей ободочной кишке. Гистологически чаще представлен тубулярной аденокарциномой. Вторая опухоль локализуется чаще в коже, в теле матки, предстательной железе, почке, молочной железе, желудке. Вторая опухоль выявлялась преимущественно на первой стадии. За 10 лет умерло 39% человек, из них 70% умерли от рака правых отделов толстого кишечника. Продолжительность жизни до года составила 77 человек (100%), один год -30 человек (38,9%), два года -13 человек (16,8%), 3 года – 6 человек (7,7%), 4 года – 5 человек (6,4%), 5 лет – 3 человека (3,8%), 6 лет -1 человек (1,3%).