

Платонова С. Ю., Белинская М. К.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДОВ РОДОВ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ПАЦИЕНТОК РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Коршикова Р. Л.

Кафедра акушерства и гинекологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Для Республики Беларусь характерна тенденция к увеличению среднего возраста женщин при рождении первого ребенка. По данным Белстат в нашей стране в 2017 году средний возраст первородящих женщин составил 26,3 года, когда в 2010 году эта цифра составляла 24,4 года. Увеличение среднего возраста первородящих ассоциируется с увеличением рисков осложнений беременности и родов, таких как преэклампсия, аномалии родовой деятельности, гипотонические кровотечения.

Цель: анализ особенностей беременности и родов, а также исходов беременности у женщин старшей возрастной группы.

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй родов 70 пациенток старшей возрастной группы (старше 30 лет), родоразрешенных на базе УЗ «Родильный дом №3» г. Минска за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (исследуемая группа), а также историй развития их новорожденных (n=74). В качестве контрольной группы были выбраны 70 женщин, родивших первого ребенка в возрасте от 18 до 29 лет за тот же период, были изучены истории родов (n=70) и истории развития новорожденных (n=71). Критерии исключения: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10. Для определения достоверности данных использовался точный критерий Фишера (двусторонний).

Результаты и их обсуждение. В ходе работы было выявлено, что в исследуемой группе осложнения беременности со стороны матери наблюдались в 85,7% случаев (n=60), в 60% — со стороны плода (n=42). В контрольной группе эти значения равны 71,4% (n=50) и 48,5% (n=34) соответственно. В исследуемой группе осложнения родов со стороны матери встречались у 65,7% (n=46) пациенток, в контрольной группе — у 55,7% (n=39), со стороны плода — в 22,8% (n=16) случаев в исследуемой группе, а в контрольной — 18,6% (n=13). Методом КС было родоразрешено 30% женщин (n=21) в старшей возрастной группе и 24% женщин (n=17) в контрольной группе. В исследуемой группе операцией наложения вакуум-экстратора было родоразрешено 5 женщин (n=5), а в контрольной группе он использовался в 1 случае. В результате анализа исходов родов было выявлено, что на пост интенсивной терапии в основной группе поступило 31,1% новорожденных (n=23), что в 2 раз превышает данный показатель в контрольной группе — 15,5% (n=11).

Выводы. Исходя из результатов работы, можно сделать вывод, что процент осложненных беременностей и родов выше у женщин, родивших первого ребенка в возрасте после 30 лет. Также исход родов для матери и новорожденного в старших возрастных категориях менее благоприятный в сравнении с молодыми женщинами.