

Короткая Ю. А., Лобода А. А.
**НОЗОЛОГИИ И ЧАСТОТА СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПРИ СРЕДНЕМ ОТИТЕ**

Научный руководитель ассист. Загурская М. С.

Кафедра болезней уха, горла, носа

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Средний отит – это широко распространенное заболевание, которое отмечается во всех возрастных группах. Заболевание имеет вариабельную сопутствующую патологию, которая имеет тенденцию к прогрессии.

Цель: проанализировать нозологии и частоту заболеваний, которые сопутствуют среднему отиту в практике оториноларинголога.

Материалы и методы. Был осуществлен ретроспективный анализ 658 историй болезни пациентов 4 ГКБ с диагнозом негнойный средний отит, гнойный и неуточненный средний отит с 2016 по 2018 года. Из них в 2016 году женщин - 86, мужчин - 76, в 2017 году женщин - 130, мужчин - 118, в 2018 г женщин - 146, мужчин - 102.

Результаты и их обсуждение. Искривление носовой перегородки – самое частое сопутствующее заболевание (12%), затем следует хроническая смешанная тугоухость (10,6%), а третью позицию занимает хроническая сенсоневральная тугоухость (9,3%). Синуситы составляют 8,7%, наружный отит – 6,4%, хронический ринит 6,2%, на мастоидит приходится 4,2%, невралгия лицевого нерва составляет 2,4%, хронический тонзиллит – 2,2%, хронический фарингит 2,2%, полип наружного слухового прохода составляет 2%, холестеатома – 1,3%

Выводы. На основании проведенного анализа можно утверждать, что для профилактики сопутствующих заболеваний при среднем отите, первоначально стоит профилактика возникновения приобретенной деформации носовой перегородки. Большое значение также имеет профилактика инфекционных заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Стоит также избегать назначения ототоксичных антибиотиков, «петлевых» диуретиков для предотвращения возникновения нейросенсорной тугоухости.