

Яроцкая В. В.

**КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ (ОСТЕОМЫ) ОКОЛОНОСОВЫХ
ПАЗУХ**

Научный руководитель зав. ЛОР отделением для взрослых Корженевич Е. И.

ЛОР - отделение для взрослых

УЗ "Минская Областная Детская Клиническая Больница"

Актуальность. Остеомы в лор-патологии – это костные опухоли, которые преимущественно локализируются в околоносовых пазухах и наружном слуховом проходе. Они относятся к доброкачественным новообразованиям, растут медленно, при расположении в околоносовых пазухах, могут распространяться в полость черепа и вызывать опасные для жизни осложнения.

В последнее время, отмечается рост числа пациентов с остеомами околоносовых пазух и наружного слухового прохода, нередко без клинических проявлений. С течением времени остеомы, достигая больших размеров, могут сопровождаться воспалительными заболеваниями околоносовых пазух вследствие нарушения оттока патологического отделяемого из околоносовых пазух, особенно при локализации их в области естественных соустьев и разрушения окружающих тканей путём давления на них.

Цель: анализ клинических особенностей остеомы околоносовых пазух у пациентов, госпитализированных в ЛОР-отделение для взрослых за 2015-2018 г.

Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 24 истории болезни пациентов с диагнозом «остеомы околоносовых пазух», которые находились на обследовании и лечении в УЗ «МОДКБ» за период 2015–2018 г.

Результаты и их обсуждение. При поступлении в стационар женщины составили- 62,5% (15 чел.), мужчины– 37,5% (9 чел.). Средний возраст пациентов- 39 лет. Самый минимальный возраст пациента 19 лет, а максимальный 76 лет. За период 2015 года в стационаре находилось 4 пациента, 2016г.- 6 пациентов, 2017г.- 7 пациентов, 2018- 7 пациентов. Из них 75% (18) были городскими жителями, и 25% (6) сельскими жителями. При клиническом обследовании доброкачественное новообразование (остеома) околоносовых пазух локализовалась в большинстве случаев во фронтальном синусе- 84%, 8%- фронтальном синусе и ячейках решетчатой кости, %- ячейках решетчатой кости. У 50 % наблюдалось смещенная носовая перегородка, 24 % вазомоторный ринит, 4% полип дна полости носа. Жалобы при поступлении: головные боли 76%, затруднённое носовое дыхание 60%, и 1 пациент жалоб не предъявлял. У 3 пациентов при хирургическом вмешательстве отмечалось мукоцеле околоносовых синусов. Ввиду тяжести патологии и необходимости хирургического лечения среднее количество койко-дней, проведённых в стационаре, составило 14.

Выводы: 1. Определяется рост числа пациентов с остеомами околоносовых пазух за период с 2015 по 2018 г. 2. Чаще остеома околоносовых пазух встречалась у лиц женского пола 62,5%. 3. Средний возраст госпитализированных пациентов 39 лет. 4. Среди всех пациентов с остеомой преобладали жители городов 75%. 5. В большинстве случаев остеома локализовалась во фронтальном синусе 84%. 6. Основной жалобой при поступлении были головные боли 76% и в 60% случаев затруднённое носовое дыхание. 7. Было проведено хирургическое лечение в 92% случаев. 8. У 3 пациентов при хирургическом вмешательстве отмечалось мукоцеле околоносовых синусов. 9. У 50 % наблюдалось смещенная носовая перегородка, 24 % вазомоторный ринит, 4% полип дна полости носа.