

*Валова М. Г.*

## **ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мощик К. В.*

*Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Острые кишечные инфекции (ОКИ) относятся к числу весьма значимых для воинских контингентов инфекционных заболеваний, что обуславливает актуальность их эпидемиологического изучения.

**Цель:** эпидемиологический анализ заболеваемости военнослужащих срочной службы одного из соединений Вооруженных Сил РБ острыми кишечными инфекциями за период с 2014 года.

**Материалы и методы.** Источником исходной информации для проведения исследования служили сводные данные учетно-отчетной медицинской документации – форма 3/мед (медицинский отчет за год с объяснительной запиской). Методы исследования: статистические; методика определения военно-эпидемиологической значимости отдельных заболеваний или групп болезней.

**Результаты и их обсуждение.** Многолетняя динамика заболеваемости военнослужащих ОКИ на протяжении периода наблюдения характеризовалась чередованием неравномерных по продолжительности периодов роста и снижений ее показателей с умеренной общей тенденцией к снижению со среднегодовым темпом  $-1,43\%$ . Для годовой динамики заболеваемости была типична присущая ей сезонность, выражавшаяся значительной интенсификацией эпидемического процесса кишечных инфекций в летние и осенние месяцы. Подъем заболеваемости начинался в начале июня и заканчивался в первой половине ноября. Общая продолжительность подъема составляла свыше 4 месяцев, а ее пик наблюдался в сентябре-октябре.

На уровне заболеваемости военнослужащих ОКИ существенно влияли возникавшие в отдельных воинских частях и учреждениях соединения вспышки этих заболеваний. К основным причинам групповой заболеваемости ОКИ следует отнести нарушения санитарно-гигиенических требований в процессе приготовления пищи, а также при доставке готовой пищи от кухонь к местам раздачи.

Факторами, способствовавшими возникновению заболеваемости ОКИ, являлись неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние объектов питания и нарушения условий хранения пищевых продуктов.

**Выводы.** На протяжении периода наблюдения заболеваемость военнослужащих срочной службы ОКИ характеризовалась умеренной многолетней эпидемической тенденцией к снижению. В годовой динамике заболеваемости ОКИ наблюдалась летне-осенняя сезонность со средней продолжительностью периода подъема более 4 месяцев.