

*Макоед Л. Г., Сулима Я. А.*

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАНКРЕАТИТА

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ключко Д. А.*

*Кафедра военно-полевой хирургии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Несомненная важность данной проблемы обусловлена стабильной тенденцией к возрастанию уровня заболеваемости панкреатитом в большинстве стран мира, в том числе, и в Республике Беларусь. Несмотря на достижения современной медицины и накопленный практический опыт в области панкреатологии, вопросы, касающиеся ранней диагностики и адекватной терапии панкреатита и его осложнений, остаются открытыми. Согласно данным официальной статистики, общая летальность при панкреатитах остается высокой и составляет 7-15%, а при деструктивных формах может достигать 40-70%.

**Цель:** провести анализ лечения пациентов с панкреатитом, проследить заболеваемость данной патологией и ее динамику в течении пяти лет.

**Материалы и методы.** Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении экстренной хирургии УЗ "2 городская клиническая больница" г. Минска в период с января 2014 года по декабрь 2018 года с диагнозом «панкреатит».

**Результаты и их обсуждение.** За период с января 2014 по декабрь 2018 года в отделении экстренной хирургии УЗ «2 городская клиническая больница» проходило лечение 1785 пациентов. Из них женщины составили 39,68% (744 пациента), мужчины – 60,32% (1131 пациент). Возраст пациентов составил от 16 до 99 лет, средний возраст пациентов –  $43 \pm 4,2$  года. Чаще данная патология наблюдалась в возрасте от 36 до 45 лет. В период с 2014 по 2018 гг. пик заболеваемости панкреатитом пришелся на 2015 год (416 случаев), сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости панкреатитом и в 2018 году зафиксирован 231 случай. В 136 случаев (7,6%) использовалось хирургическое лечение. Чаще всего применялись операции с лапароскопическим доступом (82 случая), в ходе которых была произведена санация брюшной полости с постановкой дренажей. Также использовались эндоскопическая папиллосфинктеротомия (25 случаев), эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (18 случаев), наложение панкреатоюноанастомоза на Ру петле (4 случая), резекция тела и хвоста поджелудочной железы (1 случай) и другие методы хирургического лечения. Среднее число койко-дней составило  $8 \pm 0,2$  дня.

**Выводы.** Чаще панкреатит развивается у лиц мужского пола (60,32%). Средний возраст пациентов составляет  $43 \pm 4,2$  года. Наиболее часто данная патология наблюдалась у лиц среднего возраста, это связано с изменением пищевого поведения, злоупотреблением алкоголя, наличием вредных привычек, другим стилем жизни в данном возрасте. Хирургическое лечение применяется только в 7,6% случаев, что свидетельствует о том, что большинство панкреатитов носят легкую форму, которая поддается консервативному лечению. Также была выявлена тенденция к снижению заболеваемости панкреатитом на 17,5%.