

Ананько А. Д., Ачеповская А. А.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА 3 УРОВНЯ И ПОИСКА ПУТЕЙ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Научный руководитель ассист. Тихонович Е. В.

Кафедра акушерства и гинекологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Высокая частота операции кесарева сечения в последние десятилетия вызывает озабоченность мирового экспертного сообщества в сфере здравоохранения. В 2014 году эксперты ВОЗ внедрили международную систему классификации (классификация Робсона) в качестве стандарта для оценки, мониторинга и сравнения показателей операции кесарева сечения (КС) в учреждениях здравоохранения разных уровней.

Цель: провести анализ частоты операций кесарева сечения в УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска за период 2018-2019 гг. с использованием 10-ти групповой классификации Робсона для поиска путей снижения частоты кесарева сечения.

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 3361 истории родов за 2019 год и 3543 истории родов за 2018 год с использованием 10-ти групповой классификации Робсона. Для каждой группы рассчитан размер группы, частота кесарева сечения, абсолютный и относительный вклад группы в общее количество КС. Данные обработаны методами математической статистики с использованием программного обеспечения MS Excel 2010.

Результаты и их обсуждение. В 2019 году наблюдалось снижение числа родов по сравнению с 2018 годом- 3361 и 3543 родов соответственно, однако число операций кесарево сечение оставалось на прежнем уровне — 1062 (31,6%) в 2019 году, 1121 (31,6%) в 2018 г.

Среди анализируемых групп, как в 2019 г., так и в 2018 г. преобладали первородящие женщины без рубца на матке, относящиеся к 1-й и 2-й группам, что суммарно составило 45,2% и 47,3% всех родов соответственно.

Пациентки в сроке гестации более 37 недель, одноплодной беременностью, головным предлежанием плода и спонтанным началом родов были отнесены к 1-й и 3-й группам и составили больше половины всех родоразрешенных—2270 (67,5%) в 2019 году и 1977 (55,8%) в 2018 году – это самый многочисленный контингент. Частота кесарева сечения в 1-й группе составила 26,4% в 2019 году и 28,6% в 2018 году. Частота абдоминального родоразрешения в 3-й группе была наименьшей как в 2019 г. (5%), так и в 2018 г (5,4%). Наибольший относительный вклад в общее число оперативного родоразрешения внесла 5-я группа (повторнородящие с гестационным сроком более 37 недель, одноплодная беременность, головное предлежание, с одним или несколькими кесаревым сечением в анамнезе) — 33,5% в 2019 году и 38,4% в 2018 году, а так же группа 2 (первородящие с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥ 37 недель гестации, с индукцией родов или родоразрешением путем операции кесарева сечения до начала родовой деятельности) — 19,7% в 2019 г. и 22,9 % в 2018г.

Выводы. Наибольшее влияние на общую частоту КС в УЗ «1 ГКБ» за период 2018-2019 гг. оказали женщины с одноплодной доношенной беременностью в головном предлежании, в том числе с анамнезом КС (группы № 1, 2 и 5), этот контингент можно рассматривать в качестве резерва снижения частоты абдоминального родоразрешения. Расширение возможностей ведения родов через естественные родовые пути после предыдущего кесарева сечения является одним из возможных путей снижения частоты КС.