

*Садовская А.Г.*

## **АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛУЧАЕВ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ**

*Научный руководитель ассист. Кочина Е.В.*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Паратонзиллярный абсцесс - заболевание, характеризующееся воспалением в паратонзиллярной клетчатке и окружающих её тканей. Основным возбудителем рассматривается В- гемолитический стрептококк группы А. Данное заболевание весьма актуально, так как патология лимфаденоидного глоточного кольца занимает лидирующее место в структуре ЛОР-болезней, особенно у детей и лиц молодого трудоспособного населения, неуклонно наблюдается тенденция к росту обращаемости за помощью в связи с данной патологией. Огромное значение имеет своевременная диагностика данного заболевания, выбор наиболее эффективного метода лечения.

**Цель:** исследовать, проанализировать случаи паратонзиллярных абсцессов на базе оториноларингологического отделения №1 УЗ "4 ГКБ им. Н.Е.Савченко"

**Материалы и методы.** Данные архива оториноларингологического отделения №1 УЗ"4ГКБ им. Н.Е.Савченко".

1) изучение теоретических основ данной патологии, обобщение данных научной литературы;

2) работа с историями болезней стационарных пациентов;

3) анализ полученных данных.

**Результаты и их обсуждение.** Сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, в среднем удлиняли срок пребывания в стационаре до 10 дней, в то время как неосложненный паратонзиллярный абсцесс излечивался в течении 7 дней. Болеют в основном молодые лица, трудоспособного возраста. Гендерная принадлежность, так же как и сезонность, не имеет статистически значимых различий.

В ходе лечения предпочтение отдавалось вскрытию и дренированию абсцесса. При рецидивирующем течении заболевания проводилось вскрытие и дренирование абсцесса с последующей тонзиллэктомией в течении 5 дней. Одномоментная тонзиллэктомия не проводилась.

**Выводы.** Данная проблема весьма актуальна и в настоящее время. Необходимо очень внимательно относиться к выбору эффективного способа лечения, профилактики рецидивов паратонзиллярных абсцессов. Для профилактики рецидивов паратонзиллярных абсцессов возможно применение двусторонней тонзиллэктомии в «тёплом» периоде.