

*Шепетько М. Н., Корень Т. А.*

**АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА 25 ЛЕТ  
(1984–2008 гг.)**

*Кафедра онкологии БГМУ, г. Минск*

В настоящее время ведется дискуссия о темпе прироста злокачественных новообразований в Республике Беларусь. Для объективной оценки показателей заболеваемости проведен анализ данных на основе канцер-регистра Республики, имеющихся в архиве кафедры онкологии БГМУ с 1984 по 2008 гг. Полученные результаты позволили дать объективную оценку эпидемиологической ситуации злокачественных новообразований, исходя из строгих учетных данных официальной статистики. По сравнению с 1984 г. в 2008 г. у мужчин отмечено достоверное увеличение заболеваемости раком пищевода в 2,1 раз, ободочной кишки — в 2,86 раз, прямой кишки — в 2,2 раза, легких — 1,62, гортани — 1,47, мочевого пузыря — 2,3 простаты — 5,47, кожи — 2,77, щитовидной железы — в 2,69 раз. В тоже время заболеваемость раком губы уменьшилась в 1,63 раза, желудка — в 1,1 раз. Общая онкологическая заболеваемость мужского населения за этот период возросла почти в 2 (1,96) раза.

У женщин также отметилась тенденция к увеличению заболеваемости злокачественными новообразованиями в течение этого периода. Частота рака прямой кишки увеличилась в 1,55 раз, ободочной — в 2,68, легких — 1,36, кожи — 3,1, молочной железы — 2,28 раз, шейки матки — 1,1, тела матки — 2,5 раза, яичников — 1,43, мочевого пузыря — 2,56, щитовидной железы — в 4,8 раза. В то же время показатель заболеваемости раком желудка уменьшился в 1,2 раза, а изменение заболеваемости раком пищевода, губы и гортани не имеют существенных различий и остаются на низких цифрах в структуре заболеваемости женского населения.

Следовательно, с 1984 по 2008 гг. отмечается увеличение частоты злокачественных опухолей в общей структуре заболеваемости по Республике Беларусь в 2 раза. Полученные данные отражают объективную тенденцию роста злокачественных новообразований в Республике Беларусь.