

Козлова В. В.

ОЦЕНКА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОККЛЮЗИОННЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ МУЛЬТИБОНДИНГОВОЙ СИСТЕМОЙ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гресь Н. А.

Кафедра общей стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Состоятельность окклюзионных взаимоотношений обеспечивает полноценное функционирование зубочелюстной системы, снижает риск возникновения заболеваний тканей периодонта и ВНЧС. В норме площадь окклюзионных контактов составляет 4мм². Увеличение или уменьшение площади ведет к перегрузке тканей периодонта (локальной или генерализованной). Средством контроля окклюзии при стоматологическом лечении является окклюдодиаграмма. Окклюдодиагностика – это метод выявления и регистрации окклюзионных контактов на каких-либо носителях при смыкании зубных рядов. Диагностика окклюзионных взаимоотношений является немаловажной задачей при оценке эффективности ортодонтического лечения.

Цель: оценить качество окклюзионных контактов у студентов стоматологического факультета, завершивших лечение мультибондинговой системой.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 студентов стоматологического факультета в возрасте от 18 до 25 лет, прошедших ортодонтическое лечение более года назад. Обследованным проводили окклюдодиагностику с помощью воска бюгельного 0,2. Оценивались контакты в положении центральной окклюзии. Результаты сравнивались с эталонной окклюдодиаграммой пациента с прикусом 1 класса по Энгля и множественными фиссурно-бугорковыми контактами. Данные исследования вносились в специально разработанную карту обследования. Для документирования результатов были получены макроснимки зубов и окклюдодиаграмм с помощью камеры Lumix GX7.

С целью выявления уровня окклюзионного контроля методом анкетирования было опрошено 50 врачей-ортодонт.

Результаты и их обсуждение. В результате исследования окклюзионных контактов было выявлено, что большинство пациентов после ортодонтического лечения не имеют полноценных фиссурно-бугорковых взаимоотношений.

Большинство врачей-респондентов разного профиля корректируют окклюзионные контакты в конце лечения с помощью копировальной бумаги. Оценку окклюзионных взаимоотношений до лечения и контроля после лечения с помощью окклюдодиаграммы проводит незначительное количество респондентов.

Выводы. Окклюдодиагностика — метод регистрации окклюзионных контактов, позволяющий оценить эффективность стоматологического вмешательства и выявить нарушения окклюзионных взаимоотношений зубов. В большинстве случаев у пациентов, прошедших ортодонтическое лечение, отсутствуют нормальные окклюзионные фиссурно-бугорковые контакты, что позволяет отнести данную категорию пациентов к группе риска по возможности возникновения заболеваний тканей периодонта и ВНЧС.