

Кузьменкова Д. С., Заяц М. А.
**РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПАЦИЕНТОВ
С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ**
Научный руководитель ассист. Берёзкин Р. В.
Кафедра общей хирургии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. За последнее время увеличилось число пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей, также эта патология среди молодых людей стала встречаться чаще на 30%, что связано с социально-экономическими факторами, изменением образа жизни населения. По данным ВОЗ, в мире ВБНК страдает до 20% взрослого населения. Часто служит причиной утраты трудоспособности.

Цель: установить факторы риска и осложнения патологии; определить эффективность консервативного и оперативного методов лечения.

Материалы и методы. Проведен анализ и обработка 234 амбулаторных карт за 2014-2019 год пациентов с ВБНК на базе 5 ГКБ. Собраны статические данные о распространенности ВБНК, ее клинические проявления и осложнения, а также факторы риска.

Использован метод ретроспективного анализа с обработкой результатов в программе Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. По предварительным результатам анализа амбулаторных карт, 29,91% пациентов лечились оперативным способом, из них 7,69% имели рецидив. Доля пациентов, поступающих в больницу повторно, составила 23,93%. Осложнение в виде трофических язв до оперативного лечения было выявлено у 58,55% пациентов с ВБНК.

Выводы. По нашим данным, на 14 человек, имеющих хирургическое лечение, приходится 1 человек с послеоперационным рецидивом, что является достаточно высоким показателем. В большинстве случаев послеоперационный рецидив связан с недостаточно точной дооперационной оценкой гемодинамики, что приводит к техническим погрешностям при выполнении первичной операции. Но, тем не менее, данный вид лечения остается одним из самых эффективных.