

Насмурова Ю. С., Маркевич Т. А.

АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Сурмач М. Ю.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Актуальность. Качество жизни — это интегральная характеристика психологического, эмоционального и социального функционирования пациентов, основанная на субъективном восприятии. С медицинской точки зрения, понятие качества жизни включает прежде всего те показатели, которые связаны с состоянием здоровья человека. Существует множество подходов к понятию качества жизни. Одним из них является модель «ощущаемого качества жизни», поскольку сложный характер взаимосвязи объективных и субъективных условий жизни не подтверждает кажущуюся вполне очевидной истину, что люди в лучших материальных условиях жизни более удовлетворены ею, чем находящиеся в относительно худших условиях.

Цель: проанализировать эмоциональное и социальное функционирование у пациентов, которые находились на лечении в хирургическом отделении г. Гродно ГKB №4 с острым панкреатитом.

Материалы и методы. Нами был проведен анонимный опрос, основанный на ВОЗ-опроснике SF-36, в котором поучаствовало 50 пациентов, находившиеся на лечении в хирургическом отделении ГKB №4 г. Гродно с острым панкреатитом в 2019 году. Вопросы в анкете формулировали так, чтобы они не требовали дополнительных пояснений. Пункты опросника сгруппированы, в том числе выделены группы позиций по эмоциональному и социальному благополучию. Применена 100-балльная шкала, где 100 представляет полное здоровье.

Результаты и их обсуждение. Эмоционально функционирование: минимальное значение (0%) -2% пациентов, максимальное (76%)-4%, среднее значение составило $47,12 \pm 0,33$ балла. Социальное функционирование (0%)-2% пациентов, максимальное (87,5%)-2%, среднее значение $47,25 \pm 0,32$.

Выводы. Показатели эмоционального функционирования (среднее значение $(47,12 \pm 0,33)$) и социального функционирования примерно одинаковы и находятся на уровне ниже среднего, что свидетельствует о наличии депрессивных, тревожных переживаний, психологическом неблагополучии пациентов с острым панкреатитом.