

*Полонейчик А. Н.*

## **ПЕРВИЧНЫЙ РАК ПЕЧЕНИ: ВОПРОСЫ ЛЕЧЕНИЯ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Тур Г. Е.*

*Кафедра онкологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Рак печени – злокачественная опухоль, происходящая из эпителия и возникающая из структур паренхимы печени. Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР, либо «гепатоцеллюлярная карцинома») – самый часто встречающийся вариант рака печени, который является глобальной проблемой здравоохранения. Исследователями отмечается продолжающийся рост заболеваемости ГЦР, особенно в западном полушарии. Факторами риска развития ГЦР являются гепатиты В, С и D, неалкогольный стеатогепатит, употребление алкоголя, табакокурение и некоторые другие. Реже встречается холангиоцеллюлярный рак. На 2017 год интенсивный показатель заболеваемости первичным раком печени в Республике Беларусь составил 5,2 на 100 тысяч населения, показатель смертности – 4,3 на 100 тысяч населения. Ежегодно во всём мире от рака печени погибают около 600000 человек. В Республике Беларусь на 2017 год отношение смертности к заболеваемости (индекс агрессивности опухоли) составило 82,7%.

**Цель:** изучить результаты лечения пациентов с первичным раком печени.

**Материалы и методы.** Был проведён ретроспективный анализ историй болезни больных первичным раком печени за период с 2010 по 2019 год. В исследование включен 51 пациент, отвечавший следующим условиям: 1. Наличие гистологического либо цитологического гематологического подтверждения диагноза. 2. Применение у пациента следующих методов лечения: химиотерапия, хирургическое лечение (за исключением паллиативных и симптоматических операций), химиоэмболизация, методика абляции (абляция этанолом, радиочастотная абляция). Для анализа количественных данных использовались статистические методы исследования с использованием программы SPSS Statistics 23. Среди пациентов было 38 мужчин и 13 женщин, 74,5% и 25,5% соответственно. Средний возраст на момент постановки диагноза составил  $64 \pm 9,69$  (42-81) лет.

**Результаты и их обсуждение.** В I стадии заболевание была выявлено у 3 (5,9%) пациентов, II стадия – у 7 (13,7%) пациентов, III стадия – у 17 (33,3%) пациентов, IV стадия – у 24 (47,1%) пациентов. Цитологическая верификация диагноза получена у 28 (54,9%) пациентов, гистологическая – у 23 (45,1%). Химиотерапевтическое лечение применялось у 47 (92,2%) пациентов, хирургическое – у 4 (7,8%) пациентов, химиоэмболизация – у 6 (11,8%) пациентов, абляция – у 2 пациентов (3,9%). Среди хирургического лечения в трёх случаях была выполнена операция резекции печени, в одном – трансплантация печени. Одногодичная летальность составила 65,96%, медиана выживаемости – 8,3 месяца, трёхлетняя выживаемость – 8,89%.

**Выводы.** Для лечения первичного рака печени в данной группе пациентов чаще всего применялись химиотерапевтические методы – 92,2% пациентов. Несмотря на проводимое лечение, заболевание характеризуется высокой летальностью. Также нами был отмечен большой удельный вес пациентов с III-IV стадией заболевания.