

*Пилипчук Н. В.*

**МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЁГКИХ  
У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ**

*Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Недзьведь М. К.*

*Кафедра патологической анатомии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Согласно литературным данным, 30% смертей населения в трудоспособном возрасте обусловлено пагубным употреблением алкоголя. На сегодняшний день в Республике Беларусь, по данным Всемирной организации здравоохранения, уровень потребления алкоголя составил 8,1 л на одного взрослого человека старше 15 лет. В связи с особенностями метаболизма этанола в организме, актуальным является изучение патоморфологических изменений в легких, происходящих на фоне хронического злоупотребления алкоголем.

**Цель:** выявить патологические процессы в легких, которые стали причиной смерти пациентов с алкоголизмом.

**Материалы и методы.** Материалом исследования явились протоколы вскрытий, посмертные эпикризы и гистологические препараты 201 случая смерти за 2008-2019 гг. от осложнений алкоголизма в возрасте от 26 до 79 лет. Материал получен в УЗ “Берёзовская ЦРБ им. Э. Э. Вержбицкого” и в ГУ «РНПЦ психического здоровья». В ходе исследования были изучены снимки макропрепаратов пораженных органов, а также их микропрепараты, окрашенные гематоксилином и эозином.

**Результаты и их обсуждение.** Группу исследования составили 107 случаев смерти при алкоголизме, связанных непосредственно с патологией легочной системы. Среди исследуемых было 8(7,5%) женщин. Средний возраст составил 52,4 года – трудоспособный возраст. И 99 (92,5%) мужчин. Средний возраст составил 53,8 года – трудоспособный возраст. Выявлены морфологические изменения в легких характерные для: застойной (гипостатической) пневмонии – 49(45,7%), бронхопневмонии – 23(21,5%), абсцесса легкого – 2(1,9%), гангрены легкого – 2(1,9%), ХОБЛ – 2(1,9%). Крупозная пневмония – 29(27,1%), в случаях смерти больных алкоголизмом является основным заболеванием, а алкоголизм рассматривается как фоновая болезнь. В 15 случаях (51,7%) крупозная пневмония была вызвана *Klebsiella pneumoniae*.

**Выводы.** От патологии легких при алкогольной болезни умирают преимущественно лица мужского пола (92,5%) трудоспособного возраста (средний возраст 53,8 лет). Наиболее распространенными причинами смерти от патологии легких среди трудоспособного населения, злоупотребляющего алкоголем, являются: гипостатическая пневмония, крупозная пневмония и бронхопневмония – 45,7%, 27,1% и 21,5% - соответственно.