

Абдуллах М.А.

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА
У ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ ПРОЖИВАЮЩИХ В Г.ВИТЕБСКЕ И В Г.МИНСКЕ**

Научный руководитель ассист. Заболоцкая Л.В.

Кафедра стоматологии детского возраста

Белорусского государственного медицинского университета, г. Минск

Актуальность. Считается, что основные заболевания полости рта такие как, кариес зубов управляемы и во многих случаях могут быть предупреждены. Однако, до настоящего времени кариес зубов относится к числу наиболее распространенных болезней полости рта у детского населения нашей страны. Изучение интенсивности кариозного процесса у детей различных населенных пунктов важно для того, чтобы предложить в дальнейшем адекватные методы профилактического воздействия.

Цель: изучить распространенность и уровень интенсивности кариеса у детей 8-9 лет проживающих в г.Минске и г.Витебске.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами было проведено обследование 30 детей в возрасте 8-9 лет, проживающих в г.Витебске и 30 детей такого же возраста, проживающих в г.Минске. Для осмотра полости рта использовали стоматологический зонд и стоматологическое зеркало. Уровень интенсивности кариеса определяли в соответствии с рекомендациями П.А.Леуса.

Результаты и их обсуждение. По данным осмотра, проведенного в г.Минске и г.Витебске было выявлено, что УИК у детей проживающих в г.Витебске выше, чем у детей в г.Минске. У детей г.Минска в 36,7% определен низкий уровень интенсивности кариеса, в 43,3% средней, в 13,3% высокий, а 6,7% очень высокий. В г.Витебске в 26,6% зафиксирован низкий уровень интенсивности кариеса, в 36,8% средней уровень интенсивности кариеса, в 20% высокий уровень интенсивности кариеса, а в 16,6% очень высокий уровень интенсивности кариозного процесса. Таким образом, высокий и очень высокий уровень интенсивности кариеса наблюдался у 20% обследованных детей г.Минска, а в г.Витебске высокий и очень высокий уровень интенсивности кариеса определен 36,6%.

Выводы. Уровень интенсивности кариеса у детей проживающих в г.Витебске выше, чем в г. Минске, что возможно связано с недостатком мотивации детей и их родителей к сохранению стоматологического здоровья.