

Кидрачева Р. Р.

БЕРЕМЕННОСТЬ И БОЛЕЗНЬ СТИЛЛА ВЗРОСЛЫХ – ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Хайруллина Г. Р.

Кафедра акушерства и гинекологии

Казанский Государственный Медицинский Университет, г. Казань

Болезнь Стилла взрослых (БСВ) – это редкое аутовоспалительное заболевание не известной этиологии, с распространенностью от одного до 34 случаев на миллион человек, одинаково проявляющееся у мужчин и женщин. БСВ – это диагноз исключения, не имеющий специфических маркеров. Клинические проявления: лихорадка, сыпь, боль в суставах. Лабораторный изменения: нейтрофильный лейкоцитоз, повышение уровня ферритина в крови. Заболевание встречается редко во время беременности, поэтому на сегодняшний день его влияние на течение беременности остается недостаточно изученным.

Мной был проведен анализ научной литературы о влиянии болезни Стилла взрослых на протекание беременности и родов.

Впервые рецидив БСВ во время беременности был описан в 1980 году: исследование включало 4 пациенток с болезнью Стилла взрослых: 3 пациенток с первой беременностью и 1 пациентку с повторной беременностью. Было обнаружено, что БСВ не влияло на исход беременности, а беременность не усугубляла протекание болезни Стилла взрослых. Таким образом, понятия «беременность» и «болезнь Стилла взрослых» были разграничены.

В исследовании 2013 года в Берлине было выявлено, что во втором триместре беременности и послеродовом периоде появляются клинические признаки рецидива болезни Стилла взрослых. До беременности клиника БСВ отсутствовала. С клиническим проявлением БСВ у всех пациенток ухудшалось течение беременности.

Когортное исследование 2020 года Отдела Ревматологии и Иммунологии больницы Жуйцзинь в Шанхае включало 86 пациенток на различных сроках беременности с диагностированной болезнью Стилла взрослых. Средний возраст пациенток составлял $37 \pm 0,2$ лет. Беременных разделили на 4 группы: I группа - беременность и роды проходили минимум за 1 год до клинических проявлений БСВ; II группа - клинические проявления БСВ до начала беременности; III группа - клинические проявления БСВ во время беременности; IV группа - клинические проявления БСВ в течение 12 месяцев после родов. Результаты показали, что у пациенток с диагностированным БСВ до и во время беременности риск прерывания беременности до 20 недель был выше, чем у тех пациенток, у которых болезнь Стилла взрослых проявилась или рецидивировала после родов.

Таким образом, сегодня можно сделать вывод, что беременность и болезнь Стилла взрослых отрицательно влияют и ухудшают течение друг друга: возникает угроза рецидива или дебюта клинических проявлений БСВ, а также угроза прерывания беременности на фоне болезни Стилла взрослых.