

Морозова Д. А., Вечерко М. И.
**РУБЕЦ НА МАТКЕ ПОСЛЕ ДВУХ ОПЕРАЦИЙ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ ПО
ДАНЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ.**

Научный руководитель: канд. мед. наук, ст. преп. Классен А. А.

Кафедра акушерства и гинекологии

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург

Актуальность. Частота операции кесарева сечения(КС) в современном мире растет, также среди тех пациенток, которые в анамнезе имеют операцию КС. Наличие рубца на матке после двух операций КС-абсолютное показание для родоразрешения путем операции КС в плановом порядке.

Цель: по данным УЗИ оценить рубец(ы) на матке после двух операций КС для определения тактики ведения беременности с учётом возможных рисков осложнений.

Материалы и методы. Проспективное исследование. Выполнено на базе медицинского центра «Мама и Ребенок». В исследование включены 15 женщин, у которых в анамнезе две операции КС. Из них у 5 наступила спонтанная беременность. Критерии включения в исследование: наличие двух операции КС, отсутствие самостоятельных вагинальных родов в анамнезе, планирование беременности.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток $34 \pm 3,5$ года. Основными показаниями к первой операции КС были: тазовое предлежание плода со 2-3й степенью разгибания головки 4 женщины, клинически узкий таз 3 женщины, дистресс плода в родах 3 женщины, выпадение петель пуповины 1 женщина, слабость родовой деятельности без эффекта от родоусиления 2 женщины, отслойка плаценты 2 женщины. К повторной операции КС - наличие рубца на матке у 6 женщин, незрелая шейка матки, отсутствие эффекта от подготовки шейки матки к родам, преждевременное излитие вод, отсутствие спонтанной родовой деятельности, у 3 женщин в родах развилась слабость родовой деятельности. Среднее время от последнего КС до вступления в настоящее исследование было $3 \text{ года} \pm 7 \text{ месяцев}$. У 8 женщин по данным УЗИ определено 2 рубца на матке после двух операций КС. В 7 случаях - один рубец на матке после двух операций КС. В ходе настоящего исследования у 5 женщин наступила спонтанная желанная беременность. Из них у 4 по данным УЗИ до беременности было 2 рубца на матке после двух операций КС, у одной 1 рубец на матке после двух операций КС. У 1 женщины было выявлена эктопическая беременность в рубце на матке. Предложено прерывание беременности по медицинским показаниям, от которого беременная отказалась. В 37 недель родоразрешена путем операции КС в плановом порядке: показание: предлежание плаценты, подозрение на вращение. Кровопотеря: 4900 мл, выполнена экстирпация матки. У 3 женщин беременность завершилась срочными оперативными родами здоровыми новорожденными. Интраоперационно имело место удлинение времени операции и кровопотеря 800 ± 350 мл. У 1 женщины произошел самопроизвольный выкидыш на раннем сроке.

Выводы. Важен тщательный сбор анамнеза и оценка состоятельности рубца(ов) по данным УЗИ для прогнозирования возможных рисков при наступлении беременности у женщин с двумя операциями КС в анамнезе.