

Кожановская А.Н., Козьянина К.В.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ У ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Научный руководитель ассист. Емельянова Н.А.

Кафедра фтизиопульмонологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Важнейшей медико-социальной проблемой остается туберкулез. Особенно остро стоит вопрос заболевания туберкулезом легких лиц, находившихся в местах лишения свободы. Показатель заболеваемости пациентов, находящихся в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ), в несколько раз превышает этот показатель гражданского населения.

Цель: изучить особенности клинического течения и эффективности лечения туберкулеза пациентов, имеющих в анамнезе пребывание в ИТУ.

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 80 медицинских карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в легочном терапевтическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» г. Минска в период с 2018 г. по 2019 г. Все пациенты разделены на две группы в зависимости от наличия в анамнезе пребывания в ИТУ. Обработка материалов проводилась в программе Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение. Возрастно-половой состав пациентов первой группы (отсутствие в анамнезе пребывания в ИТУ): женщин – 27% (11 чел.), мужчин – 73% (29 чел.). Средний возраст пациентов составил 45,3 года. В структуре клинических форм туберкулеза легких преобладал инфильтративный туберкулез – 63% (25 чел.), диссеминированный – 30% (12 чел.), у 7% (3 чел.) – фиброзно-кавернозный туберкулез (ФКТ). Впервые выявленный туберкулез был у 45% обследуемых (18 чел.), а в 55% случаев (22 чел.) – рецидив заболевания. Структура лекарственной устойчивости возбудителя: множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) выявлено у 30 пациентов (75%), широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) у 8 человек (20%), монорезистентность выявлена у 2 человек. Абациллирование в течение месяца достигнуто у 24 человек (60%), у 40% (16 чел.) пациентов бактериовыделение сохранялось после одного месяца лечения.

Вторую группу составили пациенты, имеющие в анамнезе пребывание в ИТУ. Возрастно-половой состав пациентов: женщин – 23% (9 чел.), мужчин – 77% (31 чел.). Средний возраст пациентов составил 43,8 года. В структуре клинических форм туберкулеза легких преобладал инфильтративный у 43% (17 чел.), у 34% (14 чел.) – диссеминированный, у 23% (9 чел.) – ФКТ. Рецидив заболевания выявлен у 82% пациентов. Структура лекарственной устойчивости: 46% (18 чел.) пациентов имели МЛУ, 54% (22 чел.) – ШЛУ. Абациллирование в течение месяца достигнуто у 35% пациентов, а 65% пациентов являлись бактериовыделителями более одного месяца лечения.

Выводы. У пациентов, имевших в анамнезе пребывание в ИТУ в структуре клинических форм преобладали распространенные, имеющие рецидивирующий характер течения заболевания: (рецидивы во 2 группе встречались в 82% против 55% в 1 группе); наличие ШЛУ у пациентов 2 группы выявлялись в два раза чаще (54% против 20% соответственно); эффективность лечения в виде абациллирования в течение месяца лучше у пациентов первой группы (65% против 40% соответственно).