

Шумякова Ю. С., Ващёнок Н. И.
**МЕЛАНОМА СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛАЗА: РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
ПО ДАННЫМ МГКОД ЗА 2000-2019 ГГ.**

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Семак Г. Р.

Кафедра глазных болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Меланома сосудистой оболочки глаза является одной из самых частых внутриглазных опухолей и составляет среди них, по данным разных авторов, от 50 до 80%. Вместе с тем меланома сосудистой оболочки глаза является и одной из самых злокачественных опухолей человека.

Цель: изучить выживаемость пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза и частоту рецидивов.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ выписок из медицинских карт пациентов со злокачественными новообразованиями МГКОД 138 пациентов за 2000-2019 гг. Верификация диагноза – гистологический метод исследования биоптата. Лечение пациентов проводилось на базе РНПЦ ОМР. Средний возраст составил $58,3 \pm 12,5$ лет, медиана возраста 59 лет, доля женщин 56,5% (78), доля мужчин 43,5% (60). Всем пациентам было проведено лечение на различных стадиях заболевания: хирургическое, лазерное, брахитерапия. Выживаемость рассчитывали по первому методу лечения.

Для анализа данных использовались программы Microsoft Excel и Statistics SPSS(метод Каплан-Мейер).

Результаты и их обсуждение. По классификации TNM меланома сосудистой оболочки глаза была выявлена: T1N0M0 – 6 (4,3%), T2N0M0 – 60 (43,5%), T3N0M0 – 62 (45,0%), T4N0M0 – 9 (6,5%), на стадии впервые выявленных отдаленных метастазов 1 человек (0,7%) – T2N0M1. Всем пациентам было проведено лечение в виде энуклеации глазного яблока, лазерной терапии или брахитерапии. Лазерная терапия была проведена 6 пациентам, среднее время дожития составило $81,2 \pm 31,2$ месяца. Брахитерапия проведена 27 из 138 пациентам, среднее время дожития составило $97,3 \pm 45,8$ месяцев. Энуклеация глазного яблока выполнена 105 из 138 пациентам, среднее время дожития составило $97,3 \pm 64,1$ месяцев. У 79,7% пациентов признаков рецидива заболевания выявлено не было. Рецидив возникал в течение 1 – 5 лет.

Выводы. Выживаемость пациентов с меланомой сосудистой оболочки глаза не зависит от выбранного метода лечения: брахитерапия – $97,3 \pm 45,8$ месяцев и энуклеация глазного яблока – $97,3 \pm 64,1$ месяцев, лазерная терапия – $81,2 \pm 31,2$ месяца. У 79,7% пациентов признаков рецидива заболевания выявлено не было. Рецидив возникал в течение 1 – 5 лет.