

Володько А. В.
**АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ
В МОЛОДОМ И ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ**

Научный руководитель: ст. преп. Семёнов В. В.

Кафедра судебной медицины

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Случаи насильственной смерти трудоспособных лиц в возрасте 18-45 лет влияют на социально-экономические и демографические показатели жизни общества в государстве и заслуживают пристального внимания с целью разработки и внедрения эффективных мер по их профилактике.

Цель: определить гендерную характеристику и нозологическую структуру причин насильственной смерти лиц в возрасте 18-45 лет.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проведен ретроспективный анализ результатов судебно-медицинских экспертиз трупов за 2017-2019 гг., выполненных в отделе общих экспертиз №2 Управления судебно-медицинских экспертиз Управления государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску.

Результаты и их обсуждение. Среди анализируемых 3881 случаев смерти количество умерших в возрасте 18-45 лет составило 637, что составляет 16,41%. Из них 78,02% (n=497) – мужчины, 21,97% (n=140) – женщины. Категория насильственной смерти составляет 53,38% (n=340), ненасильственная категория – 46,15% (n=294) и категория неустановленной смерти составила 0,47% (n=3). При анализе результатов судебно-медицинских экспертиз трупов было установлено, что среди трупов категории насильственной смерти доля индивидуумов мужского пола составила 72,64% (n=247), а женского – 27,35% (n=93). Было выявлено 62,94% (n=214) индивидуумов с признаками алкогольного опьянения. Среди них мужчины – 66,35% (n=142), женщины – 33,65% (n=72). Среди видов насильственной смерти у молодых людей ведущими причинами смерти стали: отравления – 33,82% (n=115) в общей популяции (34,01% (n=84) среди мужчин и 33,33% (n=31) среди женщин); механическая асфиксия – 28,53% (n=97) в общей популяции (30,77% (n=76) среди мужчин и 22,58% (n=21) среди женщин); падение с высоты – 18,82% (n=64) в целом (12,15% (n=30) среди мужчин и 36,56% (n=34) среди женщин). Также в структуре смерти с разной долей имели место паление на плоскости, транспортная травма, повреждения тупыми и острыми предметами.

В свою очередь среди отравлений превалирует острое отравление этиловым спиртом 50,43% (n=58). Реже встречаются отравления морфином, окисью углерода, метадоном, метиловым спиртом, а также сочетанием этилового спирта с окисью углерода, психоактивными веществами. От отравлений чаще погибают мужчины – 73,04% (n=84). В структуре механической асфиксии наиболее частыми причинами смерти стали повешение (составило 70,10% (n=68)) и утопление в воде (составило 14,43% (n=14)). От механической асфиксии также чаще погибают мужчины – 78,35% (n=76).

Выводы.

1. Доля насильственной смерти молодых лиц в возрасте 18-45 лет составила 53,38% (n=340), в мужской популяции – 72,64% (n=247) от общего количества летальных случаев.

2. У молодых людей ведущими причинами насильственной смерти явились отравление – 33,82% (n=115), механическая асфиксия – 28,53% (n=97) и падение с высоты – 18,82% (n=64), их суммарная доля среди мужчин составила – 76,93%, среди женщин – 92,47%.

3. Среди молодых лиц в структуре летальных отравлений превалирует острое отравление этиловым спиртом (50,43% (n=58)); в структуре механической асфиксии – повешение (70,10% (n=68)).

4. В 62,94% (n=214) летальных случаев индивидуумы на момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения.