

Горгуль М. О.

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЕЙ В АНАМНЕЗЕ И БЕЗ НЕЕ**

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Урбанович В. И.

3-я кафедра терапевтической стоматологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Аллергические реакции являются важной социально-медицинской проблемой, которой в настоящее время уделяется большое внимание. Уровень общего и местного иммунитета, общее состояние организма, в частности наличие аллергических заболеваний, влияют на стоматологический статус пациентов, возникновение и течение заболеваний твердых тканей зубов и периодонта.

Цель: проанализировать стоматологический статус пациентов с аллергией любого генеза в анамнезе и без нее путем оценки уровня гигиены полости рта, интенсивности кариеса зубов и состояния тканей периодонта.

Материалы и методы. Проведено обследование 27 пациентов с аллергией в анамнезе и 17 пациентов контрольной группы (без аллергии), обратившихся за стоматологической помощью в ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» и УЗ «5-я городская поликлиника» в 2021 году.

Результаты и их обсуждение. После проведенного обследования, сбора анамнеза, индексной оценки стоматологического статуса пациентов двух сравниваемых групп установлено, что показатели индекса КПУ оказались равными (6,35), уровень интенсивности кариеса (УИК) в группе пациентов с аллергией характеризуется как высокий (0,31), а в контрольной группе пациентов – как средний (0,28). Уровень гигиены полости рта, оцененный с помощью индекса ОНI-S (J. C. Green, J. R. Vermillion, 1964), у пациентов с аллергией в анамнезе и пациентов без аллергии оказался удовлетворительным (1,09 и 1,12 соответственно). Индексная оценка состояния тканей периодонта периодонтальным индексом (ПИ, А. Рассел, 1956) выявила среднюю степень тяжести заболевания у пациентов с аллергией (2,5) и легкую степень тяжести патологии у пациентов без аллергии (0,6). Среди пациентов с аллергией наблюдались заболевания слизистой оболочки полости рта, такие как стоматит, глоссит.

Выводы. Сравнительный анализ стоматологического статуса пациентов с аллергией в анамнезе и пациентов контрольной группы установил, что показатели гигиены полости рта в обеих группах являются удовлетворительными (1,09 и 1,12 соответственно), состояние тканей периодонта средней степени тяжести (2,5) у пациентов с аллергией и легкой степени тяжести в контрольной группе (0,6), уровень интенсивности кариеса выше среди пациентов с аллергией (0,31), чем у пациентов без нее (0,28). Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости тщательного подхода к обследованию и лечебно-профилактическим мероприятиям у пациентов с аллергией любого генеза в анамнезе.