

*Кишкевич П. А.*

**ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДОВ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ К УПРАВЛЕНИЮ  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ  
В РЕСТАВРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ**

*Научный руководитель: ассист. Макарова О. В.*

*2-я кафедра терапевтической стоматологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Чувствительность дентина – это заболевание, сопровождающееся выраженной болевой реакцией зубов на все виды раздражителей, и выделено в отдельную нозологическую форму в МКБ-10. (К 03.80) В современной практике врача-стоматолога послеоперационная чувствительность является актуальной проблемой. По данным литературы частота явлений гиперестезии доходит до 85%. Послеоперационная чувствительность чаще всего проявляется в виде боли от термических и химических раздражителей, при накусывании. Для уменьшения частоты случаев послеоперационной чувствительности важно знать причины, вызывающие её.

**Цель:** изучить современные подходы врачей-стоматологов при управлении послеоперационной чувствительностью для улучшения качества терапевтического лечения у пациентов с кариозными поражениями.

**Материалы и методы.** Исследование проводилось путем анонимного анкетирования практикующих врачей-стоматологов терапевтического профиля. В исследовании приняли участие 50 врачей. Данные анкетирования статистически обработаны при помощи пакета анализа в MS Excel.

**Результаты и их обсуждение.** Результаты исследования свидетельствуют о значительной распространенности послеоперационной чувствительности. Анализ данных опроса позволил установить взаимосвязь между частотой появления чувствительности дентина и рядом показателей (диагноз, класс полости по Блэку, выбор адгезивных систем, соблюдение правил препарирования и полимеризации). Также изучена тактика врачей-стоматологов в устранении послеоперационной чувствительности дентина.

**Выводы.** Послеоперационная чувствительность высоко распространена при работе с композитными реставрационными материалами. Причиной гиперестезии, как правило, является нарушение технологии реставрации. Для устранения чувствительности дентина врач-стоматологи чаще всего прибегают к использованию десенситайзеров.