Лецко Е.А.

ВАРИАНТЫ ДИСТОПИРОВАННЫХ ЗУБОВ

*Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Мельниченко Ю.М.,
ст. преп. Мащенко И.В.*

Кафедра морфологии человека

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

В современной стоматологической практике по-прежнему остаются важными вопросы этиологии, патогенеза и лечения аномалий прорезывания и положения зубов, так как эти заболевания нарушают не только нормальное функционирование зубочелюстной системы, но и внешность человека, что является важным социальным фактором. Дистопия зубов — одна из зубочелюстных аномалий, при которой наблюдается неправильное расположение прорезавшегося зуба в альвеолярной дуге или за её пределами, препятствующее нормальному прорезыванию других зубов. Дистопия зубов составляет около 50 % случаев от всех зубочелюстных аномалий, затрудненное прорезывание дистопированных зубов встречается в 5-20% случаев. Самый часто встречаемый вариант - дистопия клыков верхней челюсти, а также резцов и нижних третьих моляров.

На появление данной аномалии влияют факторы, действующие на развитие зуба во внутриутробном периоде (инфекционные заболевания матери во время беременности и ребёнка, прием лекарственных препаратов, гинекологические патологии, влияние тератогенных факторов внешней среды и т.д.). Все эти факторы приводят к сдвиганию и нарушению формирования зубного ряда, развитию неправильной формы зуба, его размера, ретенции, травмированию мягких тканей полости рта, повышению риска развития болезней полости рта из-за невозможности проведения полноценной гигиены, к возникновению фолликулярных кист и одонтогенных опухолей, рассасыванию корней смежных зубов, невралгии, нарушает правильность артикуляции и произношения звуков и, конечно же, затрагивает эстетический вопрос.

Дистопированные зубы могут быть ретинированными или могут прорезываться вне зубного ряда (в области ветви нижней челюсти, верхнечелюстной пазухи, в полости носа и др.) Для диагностики дистопий используются такие методы, как осмотр, внутриротовые и внеротовые рентгенологические методики. Методом выбора при диагностике дистопий является конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). КЛКТ позволяет увидеть изображение в трёхмерном виде, оценить расположение дистопированного зуба относительно ближайших анатомических структур.

Таким образом, своевременная и полноценная диагностика дистопированных зубов является очень важной, т.к. позволяет подбирать наиболее перспективный алгоритм лечения, которое, в свою очередь, будет способствовать предотвращению развития осложнения и вторичных деформаций.