

*Сокол Ю. А.*

## **АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА**

*Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н.*

*Кафедра пропедевтики детских болезней*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Язвенный колит (ЯК) в настоящее время является частой причиной гемоколитов у детей в возрасте от 1 до 17 лет. С учётом тяжести течения ЯК и высокой вероятности неблагоприятного прогноза, знание основ диагностики и лечения данной патологии, а также периодическое изучение их региональных особенностей является актуальным.

**Цель:** улучшение качества диагностики язвенного колита (ЯК) у детей на основании установленных клинических особенностей болезни у детей 4-ой городской детской клинической больницы.

**Материалы и методы.** С целью изучения клинических проявлений язвенного колита у детей нами был проведен анализ более 150 историй болезни 47 детей с ЯК, неоднократно проходивших лечение в педиатрическом отделении для гастроэнтерологических больных 4 городской детской клинической больницы г. Минска и наблюдавшихся затем на базе амбулаторно-консультативного отделения с 2008 по 2020 год.

Методы – статистический (Excel 2013).

**Результаты и их обсуждение.** Средний возраст детей составил 9,33 года, мальчиков наблюдалось 25 (53,2%), девочек – 22 (46,8%). При анализе распределения детей по возрасту, в котором был установлен диагноз, оказалось, что больше чем у половины детей диагноз был установлен в возрасте от 11 до 17 лет.

При оценке частоты встречаемости ЯК в зависимости от тяжести его течения в группе наблюдения оказалось, что лёгкое течение болезни наблюдалось редко – 4,3% пациентов, среднетяжёлое течение – 70,3% ребенка, и тяжёлое течение (острый тяжёлый колит) имело место в 25,4% случаях.

При анализе протяжённости патологического процесса (оценка проведена у 46 детей) установлено, что в группе наблюдения тотальный колит имел место практически у половины детей, составив 47,8%, левосторонний встречался в 34,8% случаев, и проктосигмоидит – у 17,4% детей.

Распределение протяжённости патологического процесса в зависимости от возраста видно, что у детей всех возрастных категорий тотальный колит составлял существенную долю, и наиболее часто регистрировался у детей в возрасте до 6 лет, составив 66,66%.

**Выводы.** Язвенный колит у детей регистрируется в любом возрасте, причем существенную долю составляют дети до 7 лет (44,68%) без значимых гендерных различий.

В структуре вариантов язвенного колита у детей тотальное поражение толстой кишки имеет место практически у половины детей, составив 47,7%, левосторонний колит встречается в 34,1% случаев, и проктосигмоидит – у 18,2% детей. Наиболее часто тотальный колит регистрируется у детей в возрасте до 6 лет, составив 54,54%. Острый тяжёлый колит наблюдается у четверти пациентов.