

Яхимчик Е. А.

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ
РТА У ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ
СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА**

Научный руководитель: ассист. Брель Ю. Ю.

Кафедра ортодонтии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Ортодонтические конструкции значительно затрудняют проведение индивидуальной гигиены полости рта, ухудшая доступ, а также создавая множественные ретенционные пункты. Следовательно, это приводит к нарушению минерализующей функции слюны, микрогемодиализации в тканях периодонта, дестабилизации клеточного и гуморального иммунитета в ответ на действие микробной флоры.

Цель: сравнить индивидуальную гигиену полости рта при использовании различных средств гигиены при ортодонтическом лечении.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели было проведено обследование пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении съёмными и несъёмными аппаратами. Произведено анкетирование, статистические данные обработаны. Для осмотра полости рта использовались стоматологические зонды и зеркало, также была проведена индикация зубного налёта.

Результаты и их обсуждение. Выявлены предметы гигиены, наиболее часто используемые пациентами при ортодонтическом лечении. Проведена сравнительная оценка гигиены полости рта при использовании различных средств гигиены полости рта, а также установлен необходимый оптимум предметов, необходимых для гигиены полости рта.

Выводы. Для поддержания хорошей гигиены полости рта необходимо сочетать несколько предметов гигиены. При выборе электрической зубной щётки как основного предмета гигиены, гигиена полости рта лучше, чем при выборе мануальной. На гигиену аппроксимальных контактов зубов по большей мере влияют дополнительные средства гигиены, чем основные.