

Лецко Е. А.

ВЛИЯНИЕ ПИРСИНГА В ПОЛОСТИ РТА

Научный руководитель ассист. Колковская О.В.

Кафедра стоматологии детского возраста

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Зубочелюстной аппарат человека играет ключевую роль в процессе речеобразования, пищеварения, а также метаболизма. Поэтому так важно равновесие функциональной нагрузки в данной системе. Возникновению патологий в полости рта могут способствовать неудовлетворительная гигиена полости рта, инфекционные процессы, курение, нерациональное питание и многие другие. Инородное тело в полости рта нарушает баланс, что влечёт за собой перестройку зубочелюстной системы и вызывает ряд как местных, так и системных изменений. Одним из таких инородных тел является пирсинг.

Впервые в научных медицинских публикациях пирсинг полости рта упоминается в 1990 году. Самым распространённым видом является пирсинг языка, около 81% всех случаев. Оставшийся процент занимает пирсинг губы. За последние годы пирсинг стал достаточно популярным украшением среди молодёжи, так как способствует самовыражению персоны, стремлению выделяться в группе, создаёт определённую эстетику.

Из-за затруднения гигиенических мероприятий в полости рта и нерегулярного ухода пирсинг способствует формированию вредных привычек у пациентов, а также приводит к ряду местных осложнений, таких как рецессия десны, дефекты эмали вследствие травмы, перелом зуба, аллергия, отёк, гиперсаливация (птиализм), келоидные рубцы, нарушения речи. Встречаются и системные – тригеминальная невралгия, эндокардит, острые воспалительные процессы (ангина Людвига, абсцесс мозга), возможность инфицирования гепатитом b, c, d. Вышеуказанные причины формируют определённую важность для стоматолога предупреждения пациента о возможных осложнениях, а также обязуют способствовать мотивации пациента к тщательному уходу за полостью рта, требуют индивидуального подбора средств гигиены и осуществления профессиональной гигиены полости рта.

Немаловажное значение имеет форма и длина серьги, используемой для пирсинга. Не рекомендуется носить серьги размером больше 16 мм. Следует обращать внимание на металлический состав серьги, но лучше заменить металлические крепления с резким рельефом пирсинга на мягкие силиконовые.

Своевременное информирование пациента о последствиях пирсинга в полости рта и формирование мотивации к внимательной гигиене полости рта может способствовать уменьшению частоты встречаемости заболеваний, вызываемых данным способом украшения.