

**Котик В.А.**

**ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЧАСТОТУ ОБРАЩАЕМОСТИ  
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН К СТОМАТОЛОГУ**

**Научный руководитель: ассист. Макарова О.В.**

*Кафедра эндодонтии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск*

**Актуальность.** Ряд факторов влияет на востребованность стоматологической помощи во время беременности: социальные, личностные, финансовые, отсутствие знаний о возможной связи между здоровьем полости рта и исходом беременности. Ограничения в получении плановой стоматологической помощи во время беременности обусловлены непониманием необходимости лечебно-профилактических мероприятий, боязнью стоматологического лечения и его вреда во время беременности, низкой приоритетностью стоматологической помощи, отсутствием декларированной стоматологической помощи беременным, слабым развитием страховой медицины.

**Цель:** определить факторы риска, обуславливающие низкую обращаемость беременных женщин за стоматологической помощью.

**Материалы и методы.** Анкетирование 86 беременных женщин, участвовавших в «Марафоне женского здоровья» в 6 городской клинической больнице г.Минска с последующим статистическим анализом полученных результатов при помощи пакета статистики Excel.

**Результаты и обсуждение:** Средний возраст респондентов составил  $28,7 \pm 0,6$  лет; срок беременности (3 триместр) –  $28,7 \pm 1$  недели; замужем – 88,37% женщин, не замужем – 11,63%; у 83,72% женщин беременность была запланирована, у 16,28% - нет. 88,7% женщин имели высшее образование. Отмечали кровоточивость десны – 58,14% женщин; 9,3% (8 человек) сообщили о подвижности некоторых зубов и оголении корней, миграцию некоторых зубов в зубном ряду (появление промежутков между зубами) заметили 5,3% обследованных. 53,5% женщин посещают стоматолога 1 раз в год для осмотра, 30,2% - раз в полгода для профессиональной гигиены, 16,3% - по поводу боли и (или) разрушения зуба. 95,35% беременных женщин (82 человека) утверждают, что во время беременности нужно посещать стоматолога; прийти на бесплатный осмотр и консультацию были готовы 58,14%. 27,91% женщин сообщили, что стоматолог указывал на наличие воспаления в десне, остальные 72,09% - нет. Беседу о профилактике стоматологических заболеваний стоматологи провели у 53,49% женщин.

**Выводы:** несмотря на высокий уровень общего образования и социального статуса обследованной группы беременных женщин, а также предварительное планирование беременности, выявлен недостаток информации о важности стоматологического сопровождения при беременности и, как следствие, низкая мотивация к посещению стоматолога. Более половины женщин сообщали о наличии симптомов воспалительных заболеваний периодонта, однако только 28% получили информацию от стоматолога о необходимости лечения, и лишь треть женщин обращаются регулярно для профессиональной гигиены (каждые полгода). Наиболее эффективными представляются профилактические программы для будущих матерей, подразумевающие повышение стоматологической грамотности и мотивацию к поддержанию здоровья полости рта на этапах подготовки к беременности и в ранние сроки гестационного периода.