

Ершова Д.К.

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИЕЙ ХОАН. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Научный руководитель: ассист. Козлова Ю.С.

*Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний
Российский университет дружбы народов, г. Москва*

Актуальность. Атрезия хоан у детей является наиболее распространенной врожденной аномалией, связанной с нарушением проходимости полости носа. Атрезия может быть представлена односторонним или двусторонним заращением между полостью носа и носоглоткой, с образованием перегородки (мембранной, костной или смешанной).

Цель: Провести анализ по данным литературы по вопросу оптимальной методики хирургического лечения детей с врожденной атрезией хоан.

Материалы и методы. Был проведен анализ статей на площадке PubMed по ключевому слову «choanal atresia» за последние 5 лет (2017-2023). Мы получили 250 статей. Публикации были изучены и отсортированы по авторам, датам и краткому изложению результатов. После ручного отбора количество статей составило 45.

Результаты и их обсуждение. Проанализировано 45 статей, описывающих исследования методик хирургического лечения односторонней и двусторонней атрезии хоан у детей. Вмешательства проводились во всех случаях наличия костно-мембранной атретической пластинки. Рассмотрены основные хирургические методы подхода к хоанам, такие как: эндоназальный, транспалатинный, трансептальный и трансмаксиллярный.

Выводы: согласно полученным данным, эндоскопическая трансептальная коррекция атрезии хоан у детей, является наиболее эффективной, по сравнению с иными методами, так как имеет меньшее количество рецидивов (рестеноирования).