

*Дись М.Я.*

**СЛУЧАЙНЫЕ ПЕРФОРАЦИИ ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ  
ПРИ УДАЛЕНИИ ЗУБОВ. ПРОФИЛАКТИКИ СЛУЧАЙНЫХ ПЕРФОРАЦИЙ  
ДНА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ**

*Научный руководитель: ассист. Навоша С.А.*

*Кафедра челюстно-лицевой хирургии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** В последние годы отмечается значительный рост заболеваний верхнечелюстных пазух, связанных с заболеваниями зубов. Также отмечается увеличение осложнений при удалении зубов. Одним из частых осложнений является перфорация дна верхнечелюстной пазухи. Не всегда врачи предвидят это осложнение, и повреждение дна пазухи становится неприятной неожиданностью как для врача, так и для пациента. Если при этом врач оказывается неготовым к оказанию помощи, то у пациента возникает недоверие к врачу, что может привести к конфликтным ситуациям. Часто случайные перфорации можно было бы предотвратить при более тщательном осмотре.

**Цель:** изучить факторы, приводящие к перфорации дна верхнечелюстной пазухи. Оптимизировать методы диагностики воспалительных процессов верхнечелюстных пазух одонтогенной этиологии и аномалий расположения зубов с целью минимизация случайных повреждений дна пазухи при удалении зубов.

**Материалы и методы.** Проводилось изучение литературы по данной тематике и проведен анализ 102 историй болезни пациентов, находящихся на лечении в 1 и 2 отделениях челюстно-лицевой хирургии 11 ГКБ по поводу синуситов одонтогенной этиологии. Также проводился анализ рентгенологических исследований ОПТГ и КЛКТ указанных больных.

**Результаты и их обсуждение.** Составлен алгоритм обследования пациентов с риском повреждения дна верхнечелюстной пазухи. Отмечены основные факторы повреждения дна верхнечелюстной пазухи.

**Выводы:** перфорация дна верхнечелюстной пазухи является частым осложнением при удалении зубов, имеющих очаги хронического воспаления в области верхушек зубов и прилежащих к дну верхнечелюстной пазухи. Частой причиной случайного повреждения пазухи является пневматический тип пазухи, аномалии положения зубов, первично хронический патологический процесс в пазухе, протекающий бессимптомно. При достаточном обследовании, наличие случайных перфораций должно быть минимальным.