

*Мазуркевич С.А.*

## **ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА**

*Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Шубина С.Н.*

*Кафедра психиатрии и медицинской психологии*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Расстройства пищевого поведения являются достаточно распространенными среди девочек-подростков. Однако, диагностика данной патологии среди молодых людей, особенно призывного возраста, является значимой медико-социальной проблемой. Тщательно выявленные нарушения пищевого поведения являются достоверным предиктором психической несостоятельности лиц, отобранных для прохождения службы в Вооруженных Силах.

**Цель:** выявить и проанализировать взаимосвязь личностных особенностей и особенностей пищевого поведения 30 молодых людей в возрасте от 17 до 24, находящихся в условиях стационара в РНПЦ ПЗ.

**Материалы и методы.** Метод оценки психологической и патопсихологической оценки феноменов отклоняющегося от нормативного пищевого поведения («Шкала оценки пищевых предпочтений» - ШОПП), метод оценки патопсихологической симптоматики («Опросник выраженности патопсихологической симптоматики» - SCL-90-R), статистическая обработка полученных данных проведена с использованием программы EXCEL.

**Результаты и их обсуждение.** Средний возраст всех респондентов (медиана Me (25%-75%) составил 21 (17-24) год). Все респонденты разделены на 2 группы по показателю «Булимия» (по шкале ШОПП), после чего был проведен анализ связи уровня данного показателя с показателями «Психотизм», «Навязчивости», (по шкале SCL-90-R). Установлено, что связь между параметрами «Психотизм»-«Булимия» является статистически значимой ( $U=43,6$ ,  $p<0,001$ ), что дает основание утверждать о верности предположения, что особенности личности, близкие к психотическим, являются достоверным предиктором развития одной из форм расстройств пищевого поведения. Связь между параметрами «Навязчивости» - «Булимия» также является статистически значимой ( $U=60$ ,  $p<0,001$ ), что также является достоверным показателем значимости этого параметра.

**Выводы:** возникновение расстройств пищевого поведения, особенно в форме нервной булимии, у лиц призывного возраста неразрывно связано с особенностями психических процессов данных лиц, определяющих их склонность к развитию нарушений как невротического, так и психотического уровня.