

Жукова Н.В., Зайцева Е.В.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТОЗ С УЧЕТОМ ПОЛА И ВОЗРАСТА ПАЦИЕНТОВ

Научный руководитель: ст. преп. Провалинский А.В.

Кафедра патологической физиологии

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель

Актуальность. Согласно мировой статистике, пародонтозом страдают около 60% населения. Пародонтоз – одна из наиболее распространенных и сложных патологий челюстно-лицевой области. Это заболевание наиболее характерно для людей среднего и старшего возраста и характеризуется системным поражением тканей пародонта, возникающим из-за нарушения обмена веществ и кровоснабжения в деснах. На сегодняшний день заболевание считается неизлечимым и грозит полной потерей зубов.

Цель: провести анализ заболеваемости пародонтозом с учётом возраста и пола пациентов.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные из архива Гомельской областной стоматологической поликлиники за период 2018–2022 гг. Объектом исследования явились 21760 пациентов, обратившихся к стоматологу-терапевту. В компьютерной программе Microsoft Excel 2016 создавались электронные базы данных по следующим группам наименований:

1. Пол: мужской, женский;
2. Возраст: 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90.

Результаты и их обсуждение. Анализ данных показал, что наиболее подвержены заболеванию пародонтоз женщины. В 2018 г. пациентов-женщин было 406 человек, что составило 62,95% от общего количества пациентов за этот год. В 2019 г. – 459 человек (62,03%), в 2020 г. – 331 человек (52,62%), в 2021 г. – 392 (50,78%) и в 2022 г. – 577 (59,12%). Однако в 2019 г. частота заболеваемости мужчин составила 37,97 %, что на 0,92 % больше, чем в 2018 г., в 2020 г. на 9,41% больше по сравнению с 2019 г. и на 10,33% больше по сравнению с 2018 г. В 2021 г. на 1,84% больше, чем в 2020 г. и на 8,34 % больше, чем в 2022 г. За 2022 г. самые высокие показатели по обращаемости в Гомельскую областную стоматологическую поликлинику с пародонтозом за последние 5 лет: пациентов-женщин – 577 (59,12%), пациентов-мужчин – 399 (40,88%).

В группе пациентов, обратившихся за стоматологической помощью, наибольшая частота заболеваемости пародонтозом за 2018 год приходится на возрастной период 60–70 лет, что составляет 76,12% от числа всех обратившихся. За 2019 год пик приходится также на 60–70 лет – 395 (53,38%), но и повышена обращаемость в возрасте 50–60 лет – 259 (35%). За 2021 и 2022 годы можно отследить небольшое омоложение заболевания. В 2021 г. 496 пациентов в возрасте 50–60 лет, что составило (64,25%) и в 2022 г. – 399 человек (40,88%).

Также наблюдалось резкое увеличение частоты заболеваемости у более молодых людей возрастных групп 40–50 и 50–60 лет. В 2018 г. наибольшая частота заболеваемости приходилась на возраст 60–70 лет, тогда как в 2021 и 2022 годах на 50–60 лет. В 2021 г. количество пациентов в возрасте 50–60 лет увеличилось на 25,14% по сравнению с 2020 г. Также в 2022 г. был зафиксирован наименьший возраст пациента с пародонтозом (женщина 34 года), а наибольший в 2018 г. (женщина 85 лет).

Выводы: в результате проведенных исследований было установлено, что на данный момент идёт тенденция к "омоложению" заболевания пародонтоз. Также было выяснено, что наиболее подвержены заболеванию женщины.