

ВОПРОСЫ ОНКСТОМАТОЛОГИИ

ФАКТОРЫ РИСКА ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Белясова Л.В., Урбанович В.И., Попок Ю.С.

*УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
г. Минск, Беларусь*

Введение. В Республике Беларусь наблюдается увеличение частоты заболевания злокачественными новообразованиями челюстно-лицевой области, по отношению к общему числу злокачественных новообразований.

Цель исследования - выявить факторы риска онкологических заболеваний на стоматологическом приеме.

Объекты и методы. Проведен осмотр и анкетирование 420 пациентов по основным факторам риска онкологической патологии полости рта на базе УЗ «5-я городская поликлиника» г. Минска, проанализированы полученные данные и предложены мероприятия по профилактике онкопатологии на стоматологическом приеме.

Результаты. На основании анкетирования выявлено, что наиболее частым фактором риска является курение (80%), на втором месте - экзогенные факторы (60,5%), на третьем месте - травмирующий фактор ((27,5%) (ортопедические конструкции, острые края пломб, зубов)). Всем обследованным пациентам проведены: тщательные сбор анамнеза и осмотр, мотивация по основным факторам риска, даны рекомендации по питанию (ограничить потребление жирных, жареных и копченых продуктов, предпочитая тушеные, вареные и паровые блюда, по возможности, отказаться от очень горячей или соленой пищи, различных острых приправ и специй).

Заключение. Устранение указанных факторов является первоочередными мероприятиями в профилактике онкопатологии в челюстно-лицевой области.