

Ильюхин П. А.

**СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Смычек В.Б.

*Кафедра медицинской экспертизы и оценки качества оказания медицинской помощи
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск*

Актуальность. За последние 10 лет в Республике Беларусь наблюдается рост первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований молочной железы на 7,2% (с 2,91 до 3,12 на 10 тыс. населения). Среди злокачественных новообразований молочной железы лидирующее место занимают эпителиальные опухоли, саркомы составляют лишь около 1,0%. Несмотря на редкую встречаемость, при первичном освидетельствовании в медико-реабилитационных экспертных комиссиях, пациентам с саркомами молочной железы в большинстве случаев устанавливается как правило 2-я, а часто и 1-я группа инвалидности.

Цель: провести анализ первичной инвалидности пациентов с неэпителиальными злокачественными новообразованиями молочной железы.

Материалы и методы. Нами проведен анализ данных информационно-аналитической системы «Инвалидность» за период 2010-2020 гг. В исследование были включены пациентки с установленным диагнозом злокачественного новообразования молочной железы неэпителиальной этиологии, первично направленные для проведения медико-социальной экспертизы с целью установления группы инвалидности. Объектом исследования явились 41 женщина с саркомами и недифференцированными неэпителиальными злокачественными опухолями молочной железы. Для показателей, характеризующих качественные признаки, учитывалось абсолютное число, относительная величина в процентах (р, %), при расчете погрешности относительной величины использовался 95% доверительный интервал (95ДИ).

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что при первичном освидетельствовании первая группа инвалидности была установлена пятерым (83,3%, 95ДИ: 43,7 – 97,0) женщинам с четвертой стадией заболевания; вторая группа инвалидности – одной (25,0%, 95ДИ: 30,1 – 95,4) пациентке с I и IV стадиями, восьмерым (66,7%, 95ДИ: 39,1 – 86,2) пациенткам со второй стадией заболевания и всем 10 (100,0%, 95ДИ: 72,3 – 100,0) пациентам с третьей стадией заболевания; третья группа инвалидности при первичном освидетельствовании в медико-реабилитационной экспертной комиссии была определена троим (75,0%, 95ДИ: 30,1 – 95,4) пациенткам с I стадией и четырьмя (33,3%, 95ДИ: 13,8 – 60,9) со II стадией саркомы молочной железы.

Выводы. Таким образом, в большинстве (58,5%) случаев при первичном освидетельствовании в медико-реабилитационной экспертной комиссии, пациентам с саркомами молочной железы устанавливается 1-я либо 2-я группа инвалидности, что характеризует тяжесть первичной инвалидности у пациентов с данной патологией.