

Фрайжи А. А., Тетерич А. С.
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ФЛЕБОТРОМБОЗ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Хрыщанович В. Я.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Флеботромбоз (ФТ) занимает весомое место в структуре патологии сердечно-сосудистой системы. Посттромботическая болезнь (ПТБ) является одним из осложнений ФТ, которое приводит к инвалидизации пациентов и снижению качества их жизни.

Цель: оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения ФТ, изучить влияние различных факторов риска и проанализировать частоту развития ПТБ у пациентов, перенесших ФТ различной локализации.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 48 пациентов, которые проходили стационарное лечение на базе хирургических отделений УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска» в 2008-2013 гг. Мужчин было 30, женщин – 18. Средний возраст составил 59±11 лет. В процессе исследования оценивались клинические проявления ПТБ по шкале Виллалта, результаты ультразвукового ангиосканирования вен нижних конечностей, а также характер и приверженность лечению на амбулаторном этапе.

Результаты. Общее количество пациентов, у которых развилась ПТБ, составило 30 человек (62,5%). У 17 (56,6%) пациентов ФТ был дистальной локализации, у 9 (30%) – проксимальной, а у 4 (13,3%) пациентов – смешанной (дистальная+проксимальная). По значению индекса массы тела (ИМТ) все пациенты с ПТБ были разделены на 5 групп: с нормальным ИМТ – 6 человек (20%), с избыточным весом – 8 (26,67%), с ожирением I степени – 10 (33,3%), II степени – 4 (13,33%), III степени – 2 (6,67%). По давности перенесенного ФТ все пациенты были разделены на 3 группы: до 3 лет (1 группа) – 17 человек (35,4%), от 3 до 6 лет (2 группа) – 20 (41,6%), более 6 лет (3 группа) – 11 (23%). Частота развития ПТБ в 1 группе составила 47,1% (8 пациентов), во 2 группе – 60% (12 пациентов), в 3 группе – 91% (10 пациентов).

Выводы:

1. Частота развития ПТБ среди пациентов, перенесших ФТ, составила 62,5%.
2. Была выявлена прямая взаимосвязь между давностью перенесенного ФТ и частотой развития ПТБ.
3. Избыточная масса тела или ожирение у пациентов, перенесших ФТ, являлись факторами риска развития ПТБ.