

Маркевич О. А., Бендик Е. Р.
**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ ГЕРНИОПЛАСТИКИ С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА
SHORT MEDICAL OUTCOMENS STADY (SF 36)**

Научный руководитель ассист. Большов А. В.
2-я кафедра хирургических болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Грыжесечение остается самым частым вмешательством в структуре «плановых» операций на органах брюшной полости. Основным радикальным методом лечения грыж брюшной стенки является хирургическая операция. Традиционная оценка эффективности различных методов лечения и исходов заболеваний, основанная на использовании критериев продолжительности жизни, в плане изучения отдаленных результатов, признается, на современном уровне, неадекватной и малоинформативной. Поэтому эксперты ВОЗ предложили рассматривать изучение качества жизни пациентов в послеоперационном периоде, как логическую оценку эффективности хирургического лечения. Для этого используется опросник Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). Это неспецифический опросник для оценки качества жизни пациента, широко используемый при проведении исследований качества жизни в странах Европы и в США.

Цель: изучить и сравнить отдаленные результаты оперативного лечения паховых грыж с помощью опросника Short Form Medical Outcomes Study (SF-36) города Минска.

Материал и методы. Количество опрошенных – 50. Место проведения операции – УЗ «БСМП» г. Минска. Все анкетизируемые - пациенты после герниопластики по методикам Бассини, Жиррару-Спасокукоцкому, Лихтенштейну, Шолдайсу, Постемпскому. Использованный опросник для анкетирования основной группы: Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). Половой состав обеих групп: 33 мужчины и 17 женщин. Возрастной состав обеих групп: средний возраст 53 года. Обработка результатов опроса с помощью программы StatSoft Statistica v.6.0.

Результаты. Проведен анализ полученных данных и была определена оценка качества жизни пациентов после герниопластики за 2008г.

Выводы:

1. Показатель качества жизни пациентов по опроснику SF-36 находится выше 70 баллов, что соответствует высокому уровню жизни.
2. Качество жизни пациентов, прооперированных по методике Лихтенштейна достоверно выше, чем у пациентов прооперированных «традиционными» методами пластики.
3. Анализируя сам способ исследования, можно с уверенностью сказать, что опросник Short Form Medical Outcomes Study показал себя надежным и чувствительным методом оценки эффективности хирургического лечения грыж.