

Банецкая Е. П.
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ДИСКРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук Тименова С. В.

Кафедра неврологии и нейрохирургии
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно

Актуальность. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – это хроническая прогрессирующая форма цереброваскулярной патологии, характеризующаяся развитием многоочагового или диффузного поражения головного мозга и проявляющаяся комплексом неврологических и нейропсихологических нарушений. Когнитивные нарушения (КН) являются одним из основных видов неврологических расстройств при ДЭ. Они – это самый важный индикатор цереброваскулярной патологии. Так как когнитивные нарушения сильно усложняют и ухудшают жизнь пациентов: их коррекция – основная задача для улучшения качества жизни.

Цель: оценить выраженность когнитивных нарушений у больных с ДЭ.

Материалы и методы. В исследование включены пациенты, проходившие лечение на базе неврологического отделения БСМП г. Гродно. Для оценки когнитивного статуса использовали Монреальскую шкалу когнитивной оценки (MoCA). Чувствительность метода составляет 90%, специфичность метода – 87%. С ее помощью оценивают различные когнитивные сферы, а время проведения составляет около 10 минут.

Результаты и их обсуждение. Выборка составила 30 пациентов в возрасте от 58 до 87 лет. В неврологическом статусе наиболее часто встречались пирамидный, вестибуло-мозжечковый и амиостатический синдромы.

В исследовании по MoCA результат составил в среднем $17,5 \pm 1,0993$ балла, что является ниже нормы. Никто из респондентов не набрал результат 26 и выше баллов, что является пороговым значением для нормы. Самые низкие результаты были выявлены при оценке функции беглость речи $0,1429 \pm 0,1382$ балла. При этом пациенты не могли назвать более одиннадцати слов на одну букву. Оценка функции зрительно-конструктивных/исполнительных навыков составила $2,2857 \pm 0,4583$ балла, функция отсроченного воспроизведения – $0,5 \pm 0,401$ балла, а абстрактного мышления – $0,8214 \pm 0,2372$. Самый высокий результат $5,8214 \pm 0,1844$ были набраны в разделе ориентация на время и место, где пациенты практически всегда отвечали правильно.

Выводы. Таким образом, когнитивные нарушения определяются у подавляющего большинства пациентов с ДЭ, причем уже на ранних ее стадиях. У пациентов определяется выраженное расстройство памяти с признаками первичной недостаточности запоминания поступающей информации. Наблюдается нарушение направленного гнозиса и праксиса снижение понимания логико-грамматических конструкций.