

Войтко Д. А., Просянных М. Ю.
**КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

*Научный руководитель д-р мед. наук Катибов М. И.
ФГБУ «НИИ урологии» МЗ России, г. Москва*

Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) является одной из важных проблем современной онкоурологии в силу широкой распространенности заболевания и высокой летальности. Установлено, что повышение начальной стадии значительно повышается при использовании программ ранней диагностики (скрининга), однако в этом случае существует проблема гипердиагностики и гиперлечения. В связи с этим для улучшения качества оказания помощи пациентам с РПЖ была разработана комплексная этапная стандартизированная программа оказания урологической помощи, стартовавшая в Воронежской области в 2011 году.

Цель: улучшение результатов медицинской помощи при РПЖ путем разработки оптимальных подходов к раннему выявлению и лечению заболевания.

Материал и методы. Урологическая помощь разделена на 3 стандартизированных, комплексных этапа. Задачей первого этапа является своевременная выявляемость пациентов с РПЖ путем проведения обследования мужского населения Воронежской области в возрасте от 45 до 74 лет с дополнением к стандартному перечню скрининга РПЖ использования номограмм индивидуального риска РПЖ. Задачей второго этапа явилось обеспечение выполнения стандартных лечебных манипуляций, в том числе и оперативных пособий. Задачей третьего этапа послужило оказание высокоспециализированной медицинской помощи и проведение контроля качества. Таким образом было развёрнуто 7 межрайонных урологических центров (МУЦ) – второй этап оказания урологической помощи и 1 региональный урологический центр – третий этап.

Результаты. Исходом реализации программы в Воронежской области явилось прогрессивное увеличение абсолютного числа пациентов с впервые выявленным заболеванием РПЖ с 23845 в 2009 году до 28560 за счет увеличения доли пациентов с локализованными стадиями заболевания с 44,8 % в 2009 до 61,5% в 2012. Также отмечено прогрессивное снижение уровня летальности пациентов с впервые установленным диагнозом РПЖ с 14,6% до 9,3 %.

Заключение. Комплексная этапная стандартизированная программа «Урология» является универсальным инструментом для решения проблемы совершенствования организации медицинской помощи при РПЖ.