

Кузьменкова В. В., Янкова Ю. О.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ
РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ У ВЗРОСЛЫХ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Денисова Ю. Л.
3-я кафедра терапевтической стоматологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. На сегодняшний день болезни пародонта представляют одну из актуальнейших проблем в стоматологии. Рецессия десны имеет большую распространенность во всех возрастных группах, во взрослой от 45 до 85% (Казеко Л.А., Тимчук Я.И. 1992). Рецессия десны может быть анатомической, симптоматической и физиологической, в зависимости от этиологического фактора. В литературе современные данные о распространенности каждой клинической формы отсутствуют, что определило цель и задачи исследования.

Цель: изучить распространенность клинических форм рецессии десны у взрослых 25-29 и 35-44 лет.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели были проведены: анализ современной доступной русскоязычной литературы, обследование и анкетирование на предмет факторов риска двух групп пациентов (взрослые 25-29 лет 30 человек и взрослые 35-44 лет 30 человек), произведен анализ групп на предмет наличия и степени рецессии, уровня гигиены, класса зубочелюстной аномалии по Энгля. Данные были подвергнуты анализу и статистической обработке.

Результаты. Получены следующие данные: распространенность рецессии десны у взрослых составила $82,5 \pm 8,9\%$ из всего числа обследованных, из них $31,2 \pm 5,3\%$ взрослые до 30 лет, $51,8 \pm 6,7\%$ взрослые 35-44 года. Распространенность этиологических факторов: зубочелюстные аномалии у $18,1 \pm 4,3\%$ обследованных, окклюзионная травма у $3,0 \pm 3,2\%$, плохая гигиена у $79,9 \pm 9,5\%$ всех обследованных взрослых.

Заключение. Распространенность рецессии десны у взрослых 25-29 лет $31,2 \pm 5,3\%$, у взрослых 35-44 лет $51,8 \pm 6,7\%$. Анатомическая форма рецессии встречается реже ($21,1 \pm 9,5\%$ из общего числа обследованных), чем симптоматическая ($79,9 \pm 9,5\%$ из общего числа обследованных).