

Веленко Д. А., Калабунская В. А.
**МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЗАВЕРШЕННЫХ САМОУБИЙСТВ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПО СПОСОБАМ СОВЕРШЕНИЯ, ПОЛУ,
ВОЗРАСТНЫМ КАТЕГОРИЯМ, МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ
В Г. МИНСКЕ С 2009 ПО 2013 ГОД**

Научный руководитель ассист. Доморацкая Т. Л.

Кафедра судебной медицины

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Самоубийство является актуальной медико-социальной проблемой современного общества, демонстрирующей тенденцию к росту во многих странах мира. Для судебной медицины данная проблема всегда была и остается важной, так как самоубийства относятся к категории насильственной смерти и во всех случаях являются объектом судебно-медицинского исследования.

Цель: осуществить комплексный анализ случаев завершенных самоубийств среди взрослого населения.

Материал и методы. Работа выполнена на основании данных архива Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по г. Минску за период с 2009 по 2013 год. Обработаны результаты 11581 вскрытий.

Результаты. Нами проанализировано 517 случаев завершенных самоубийств по г. Минску с 2009 по 2013 год, что составляет 4,5% от общего числа вскрытий. По способу совершения смерть от механической асфиксии наступила в 72% случаев (повешение -96,4%, утопление – 3,6%), от падения с высоты – 14,1%, от отравления -10,4%, от огнестрельного ранения – 2,2%, от повреждения острым предметом – 1,7%, суицид в метро – 0,7%. Среди всех случаев самоубийств мужчины составили 77,4%, женщины – 22,6%, дома совершено 290 случаев самоубийств (56,1%), в алкогольном опьянении совершено 55,4% всех случаев самоубийств. В возрастной группе от 45 до 59 и от 31 до 44 лет количество самоубийств составило 26,5% и 26,1% соответственно.

Заключение. В структуре суицидов преобладает смерть от механической асфиксии. Чаще добровольно уходят из жизни мужчины трудоспособного возраста (31- 59 лет). Большинство самоубийств совершено в состоянии алкогольного опьянения у себя дома.