

**Тетерич А. С., Фрайжи А. А.**  
**ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ**  
**ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ,**  
**ПЕРЕНЕСШИХ ФЛЕБОТРОМБОЗ**

**Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Хрыщанович В. Я.**

*2-я кафедра хирургических болезней*

*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Флеботромбоз (ФТ) занимает весомое место в структуре патологий сердечно-сосудистой системы. Посттромботическая болезнь (ПТБ) является одним из осложнений флеботромбоза, которое приводит к инвалидизации пациентов и снижению качества их жизни.

**Цель:** оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения, оценить влияние различных факторов риска и проанализировать частоту развития ПТБ у пациентов, перенесших ФТ различной локализации.

**Материал и методы.** В исследовании участвовало 48 пациентов, которые находились на стационарном лечении на базе УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в период с 2008 по 2013 годы. Среди исследуемых было 30 мужчин и 18 женщин. Средний возраст пациентов составил  $59,08 \pm 11,62$  года. В ходе работы оценивались клинические проявления ПТБ у пациентов по шкале Виллалта, результаты проведенной ультразвуковой диагностики сосудов, а также лечение на амбулаторном этапе.

**Результаты.** Общее количество пациентов, у которых развилась ПТБ, составило 30 человек (62,5%). У 17 (56,6%) пациентов ФТ был дистальной локализации, у 9 (30%) – проксимальной, а у 4 (13,3%) пациентов – смешанной (дистальная+проксимальная). По значению индекса массы тела (ИМТ) все пациенты с ПТБ были разделены на 5 групп: с нормальным ИМТ – 6 человек (20%), с избыточным весом – 8 (26,67%), с ожирением I степени – 10 (33,3%), II степени – 4 (13,33%), III степени – 2 (6,67%). По продолжительности болезни все пациенты были разделены на 3 группы: до 3 лет (ГР1) – 17 человек (35,4%), от 3 до 6 лет (ГР2) – 20 (41,6%), более 6 лет (ГР3) – 11 (23%). Частота развития ПТБ в ГР1 составила 47,1% (8 пациентов), в ГР2 – 60% (12 пациентов), в ГР3 – 91% (10 пациентов).

**Выводы:**

1. Частота развития ПТБ среди пациентов перенесших ФТ в данном исследовании составляет 62,5%.
2. Существует прямая связь между продолжительностью ФТ и частотой развития ПТБ.
3. В развитии ПТБ существенную роль играют различные факторы риска, в том числе и наличие избыточной массы тела или ожирения у пациентов.