Мартыненко А. С.

СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ: ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОСОЗНАВАНИЯ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Емельянцева Т. А.

Кафедра психиатрии и медицинской психологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Чем лучше пациент осознает свою алкогольную зависимость, тем легче он поддается лечению и психокоррекции, и тем меньше шансов выхода на новый парасуицидальный эпизод.

Цель: Исследование взаимосвязи осознания алкогольной зависимости и суицидальных тенденций, корреляция с анамнестическими данными.

Материал и методы. В исследовании участвовали 56 пациентов мужского пола в возрасте 18-53 лет с установленным диагнозом «Синдром алкогольной зависимости. F10.24 Суицидальные тенденции», прошедшие стационарное лечение в психиатрическом отделении для лечения кризисных состояний ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» в период с ноября 2013г. по март 2014г. Методы: клинико-психопатологический метод; психологическая карта пациента, составленная коллективом мед. психологов РНПЦ ПЗ; статистический метод с использованием программы SPSS13.

Результаты. При анализе психологических карт, выписных эпикризов из медицинских карт стационарных пациентов и обработке данных в SPSS13, в контексте суицидальных тенденций исследовалась зависимость между осознанием пациентами своей болезни и благополучием (неблагополучием) семейного (наследственного) анамнеза, работой, образованием, возрастом и реальным семейным статусом.

Выводы:

1. Работа с процессами осознания перспективна для профилактики суицидального поведения у лиц, страдающих алкогольной зависимостью.
2. Анозогнозия и гипогнозия достаточно чётко коррелируют с суицидальными тенденциями у лиц, страдающих алкоголизмом.
3. Возраст менее 35 лет, отсутствие работы или отсутствие постоянного места работы, среднее образование, наследственная отягощенность по алкоголизму или суицидальности, неблагополучие реального семейного статуса вероятны как факторы риска суицидального поведения при алкогольной зависимости.