

Копытов Д. А.

СЕКСУАЛЬНАЯ СФЕРА У ЛИЦ МУЖСКОГО ПОЛА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Доморацкий В. А.

Кафедра психиатрии и медицинской психологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Злоупотребление ПАВ и, в частности, алкоголем, у молодых мужчин может быть связано с особенностями половой сферы и отрицательно влиять на их сексуальное поведение.

Цель: определить особенности сексуальной сферы при формировании алкогольной зависимости (АЗ) у лиц молодого возраста для обоснования профилактических мероприятий.

Материал и методы. Исследованы 205 молодых людей с АЗ ($21,8 \pm 0,2$ лет) – основная группа (ОГ); 118 лиц ($21,4 \pm 0,2$ лет) контрольной группы (КГ) без АЗ. Методики: «Б-ИТА», AUDIT, МКБ-10, шкала векторного определения половой конституции у мужчин, «Мотивы потребления алкоголя (МПА)». Биохимическое исследование (тестостерон свободный (СвТ) и связанный, креатинин, кортизол, эстрадиол, пролактин, ФСГ, ЛГ).

Результаты. В ОГ, по сравнению с КГ, больше лиц с ранней сексуальной активностью ($p < 0,05$). Обстоятельства первой сексуальной связи в ОГ: случайная связь в одной компании ($p < 0,05$), «нажим» партнерши ($p < 0,05$), состояние опьянения ($p < 0,05$), в КГ – результат длительных ухаживаний ($p < 0,05$). Значения генотипического индекса половой конституции в ОГ и КГ не отличаются. В ОГ выше уровни кортизола ($p < 0,05$) и пролактина ($p < 0,05$), в КГ СвТ ($p < 0,05$). В ОГ уровни СвТ связаны со склонностью к агрессивным реакциям ($p < 0,05$), поиску новизны ($p < 0,05$), асоциальному поведению ($p < 0,05$), в КГ со склонностью к тревожным реакциям ($p < 0,05$) и гедонистическими МПА ($p < 0,05$). В ОГ сексуальная активность связана с импульсивностью ($p < 0,05$).

Выводы:

1. Лица из ОГ, по сравнению с субъектами из КГ, более склонны к рискованному сексуальному поведению, которое характеризуется ранним началом половой жизни, причём сексуальный дебют обычно происходит при случайных связях в состоянии алкогольного опьянения.

2. При одинаковых показателях генотипического индекса в КГ и ОГ, у последних имеются более низкие показатели уровня СвТ, а их сексуальная активность больше связана с импульсивностью, склонностью к поиску новизны, агрессивными тенденциями, асоциальным поведением, но не с выраженностью либидо.

3. Более низкие базовые уровни СвТ при высокой импульсивности могут обуславливать потребность дополнительной стимуляции сексуальной функции с помощью алкоголя, что в последующем может приводить к формированию алкогольных проблем.

4. Полученные данные желательно учитывать при проведении профилактических мероприятий в молодёжной среде.