

Зазулинская О. Ю.

ОЦЕНКА ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА У ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ ПСОРИАЗОМ

*Научные руководители д-р. мед. наук, доц. Копытов А. В.,
канд. мед. наук, доц. Белугина И. Н.*

Кафедра психиатрии и медицинской психологии,

Кафедра кожных и венерических болезней

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Заболеваемость псориазом зачастую ассоциирована с психическим и психологическим состоянием, иногда способствует формированию или является следствием кожной патологии.

Цель: провести анализ психологического и психического статуса у лиц, страдающих псориазом, для повышения эффективности комплексных лечебно-профилактических мероприятий при данной патологии.

Материал и методы. Проведено исследование 95 человек. Из которых составили: 59 чел., страдающих псориазом (основная группа); 18 чел. страдающих невротическими расстройствами (группа сравнения); 18 чел. – контрольная группа, без кожной и психической патологии. Психологические тесты: SCL-90-R, тест «Мотивация успеха и боязнь неудачи», «Типы поведения в конфликте», «Рисунок человека». Статистическая обработка SPSS.17.0.

Результаты. При статистической обработке данных не установлено отличий среднегрупповых показателей мотивации на успех и мотивации на неудачу. Не установлено достоверных показателей по опроснику «Типы поведения в конфликте» по критериям: соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление. По тесту «Рисунок человека» было выявлено: в ОГ преобладают лица у которых в рисунке имеется критерий наличие одежды ($\chi^2=7,8$; $p<0,05$). Отсутствие кистей преобладает в группе невротиков, а наличие соответственно в группе псориаза и контрольной ($\chi^2=6,5$; $p<0,05$). Преобладает заштрихованность в ОГ и КГ, отсутствует в группе невротиков ($\chi^2=6,3$; $p<0,05$). В группе с невротиками достоверно больше лиц с наличием несоразмерности ног и тела ($\chi^2=5,9$; $p<0,05$). У лиц страдающих псориазом и невротическими расстройствами достоверно больше субъектов, не рисующих шею ($\chi^2=7,7$; $p<0,05$). О (I) группа крови преобладает у лиц с псориазом.

Выводы:

1. Для лиц, страдающих псориазом, более характерны психологические проблемы, свидетельствующие о сдержанности, избирательности и неудовлетворенности контактами при достаточной мотивации на их необходимость.
2. Лицам, страдающим псориазом, характерно наличие тревожности при недостаточном количестве ресурсов для разрешения имеющихся большого количества социальных проблем.
3. Для диагностики психологических проблем у лиц страдающих псориазом предпочтительнее применять невербальные методы психологической диагностики.