

*Жишкевич А. М., Селях Э. А.*  
**ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИКАРДА-ЛФ У БОЛЬНЫХ  
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ  
УСЛОВИЯХ**

*Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Антонович М. Н.  
Кафедра пропедевтики внутренних болезней  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Цель:** изучение гипотензивной и органопротективной эффективности препарата «Бикард-Лф» (Бисопролола, таб. 10мг, СООО «Лекфарм» Республика Беларусь.

**Материал и методы.** Для написания данной научной работы были проведены клинические исследования 52 человек с артериальной гипертензией. Также этим людям по завершению исследования была проведена ЭхоКг. Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением программ Statgraphics (версия 2.6) методом вариационной статистики с использованием парных критериев Стьюдента.

**Выводы:**

1. Монотерапия Бикардом-ЛФ в суточной дозе 10 мг оказывает гипотензивное действие с достижением целевого уровня АД у больных артериальной гипертензией I и II степени
2. По данным ЭхоКг монотерапия Бикардом-ЛФ в суточной дозе 10 мг достоверно улучшила систолическую функцию миокарда левого желудочка.
3. Низкая частота развития побочных эффектов при монотерапии Бикардом-ЛФ свидетельствует о селективности препарата в отношении В1-адренорецепторов.