

Ясюкайт Д. Р., Мацкевич Е. В.
**ОЦЕНКА СВОЕВРЕМЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гедревич З. Э.

Кафедра онкологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Рак молочной железы является одной из главных проблем клинической онкологии. Весьма высокое соотношение показателей смертности и заболеваемости в Республике Беларусь (31,8%) свидетельствуют об актуальности проблемы улучшения результатов лечения. Ранняя диагностика и раннее начало лечебных мероприятий, способны существенно повлиять на показатель выживаемости больных.

В соответствии с правилами диспансеризации, больные с подозрением на злокачественную опухоль должны быть в 10-дневный срок обследованы с целью подтверждения диагноза. Лица, отнесенные ко IIa клинической группе, должны быть подвергнуты радикальному лечению не позднее 10 дней с момента установления диагноза.

Цель: установить реальные сроки диагностики и начала лечения рака молочной железы в г. Минске у лиц, подлежащих радикальному лечению, изучить причины, способные влиять на несоблюдение нормативных сроков.

Материал и методы. Методом сплошной выборки для исследования отобраны пациентки, с верифицированным диагнозом рака молочной железы, поступившие для радикального лечения в онкохирургическое отделение МГКОД в период с ноября 2013г. по март 2014г. Анамнестические данные и результаты изучения медицинской документации занесены в электронные таблицы с последующей статистической обработкой материала.

Результаты. Анализ полученных данных показал, что обращение пациенток за медицинской помощью при самостоятельном выявлении опухоли не зависит от стадии болезни и варьирует от 1 до 465 дней с момента обнаружения новообразования. Среднее число дней необходимое для направления больной из поликлиники в онкодиспансер составляет 16,7. Медиана от момента взятия на диспансерный учет до начала лечения оказалась равной 11,7 дня, а период от манифестации клинических признаков болезни до начала специального лечения – 109,1 дня.

Выводы:

1. Среди женщин страдающих раком молочной железы, отнесенных ко IIa клинической группе сроки уточняющей диагностики и начала радикального лечения превышают нормативные.

2. Основными причинами нарушения нормативных сроков являются: а) позднее обращение пациенток за медицинской помощью; б) позднее их направление в специализированное онкологическое учреждение.