

Скобялко Ю. А., Сомов Е. В.

**ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЕРВИЧНОГО ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Козловская А. Н.

Кафедра онкологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Введение. Для населения Республики Беларусь, подвергшегося действию радиации, вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, существенно повышен риск возникновения папиллярного рака щитовидной железы. В течение последних 20 лет 95% рака щитовидной железы, который встречается на территории Беларуси, приходится на папиллярный рак щитовидной железы. Несмотря на изученность вопросов папиллярного рака, в РБ данная проблема не утратила свою актуальность и требует дальнейшего изучения на современном этапе.

Цель: определить половозрастные особенности и частоту встречаемости морфологических форм первичного папиллярного рака щитовидной железы.

Материал и методы. Проанализированы амбулаторные карты, истории болезней и гистологические карты 150 пациентов, оперированных в Республиканском Центре опухолей щитовидной железы за 2011-2012 гг.

Результаты. В результате ретроспективного анализа историй болезней, амбулаторных и гистологических карт определены морфологические варианты первичного папиллярного рака щитовидной железы, а также частота их встречаемости в изученных половозрастных группах.

Заключение. Необходимо углубленное изучение данной проблемы для улучшения, а также выбора индивидуального плана лечения и реабилитации пациентов с данным заболеванием.