

Лукомская А. В., Фандо И. С.
**РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЙОДДИАГНОСТИКИ БОЛЬНЫХ РАКОМ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ**

Научный руководитель ассист. Минайло Т. И.

Кафедра онкологии

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. Результаты научных исследований по данной тематике могут быть использованы при выборе тактики лечения больных папиллярным и фолликулярным раком щитовидной железы, а также при оценке эффективности проведенного радикального хирургического лечения.

Цель: изучение эффективности радикального хирургического лечения папиллярного и фолликулярного рака щитовидной железы.

Материал и методы. Исследование носило единовременный наблюдательный выборочный характер. Было проведено исследование учётной медицинской документации (амбулаторные карты) 200 больных папиллярным и фолликулярным раком щитовидной железы за 2010 и 2012 годы на базе МГКОД.

Результаты. Проведен анализ полученных данных и определено, что менее 5% больных папиллярным и фолликулярным раком щитовидной железы после проведения радикального хирургического лечения нуждаются в повторном хирургическом лечении.

Выводы:

1. По данным исследований, в повторном хирургическом лечении нуждается менее 5% больных папиллярным и фолликулярным раком щитовидной железы.

2. Метод радиойоддиагностики позволяет оценить эффективность радикального хирургического лечения больных папиллярным и фолликулярным раком щитовидной железы.