Курбасова Д. М.

ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Родионова О. И.

Кафедра болезней уха, горла, носа

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

Актуальность. По данным генетической лаборатории Академии наук Республики Беларусь, заболеваемость муковисцидозом в РБ составляет – 1:8000 новорожденных. По данным ВОЗ, носителями гена муковисцидоза являются от 2% до 5% населения планеты; в Республике Беларусь носителем гена заболевания является каждый 50-й житель. Число пациентов с муковисцидозом (МВ) в США превышает 30000, в странах западной Европы – более 35000, среди них взрослых пациентов – более 50%. В литературе отмечается увеличение продолжительности жизни пациентов с МВ (в развитых странах до 40 лет). А в прогнозах учёных относительно детей, рождённых после 2000г. – ожидается увеличение до 50 лет.

По данным разных авторов, практически у всех пациентов с МВ развиваются хронические синуситы. В большинстве случаев у пациентов детского возраста формируются полипы околоносовых пазух, часто рецидивирующие после полипотомии, что, в сущности, может провоцировать распространение инфекции к среднему уху и развитие острого среднего отита у таких пациентов.

Цель: провести оценку заболеваемости острым средним отитом у пациентов, проходивших стационарное лечение по поводу муковисцидоза в УЗ «З ГДКБ» г. Минска с 2016 по 2021гг.

Материалы и методы. В ходе исследования были изучены 52 карты стационарных пациентов с муковисцидозом, проходивших лечение в УЗ «ЗГДКБ» г. Минска с 2016 по 2021гг.

Результаты и их обсуждение. Эпизоды острого среднего отита зафиксированы у 7 пациентов (13,5%).

Из выявленных случаев заболеваемости острым средним отитом (ОСО) медиана возраста пациентов с ОСО составила 5,5 лет (от 6 месяцев до 17 лет). Зафиксированные эпизоды ОСО были отмечены у пациентов в возрасте от 6 месяцев до 9 лет.

У всех пациентов, которым проводилось КТ околоносовых пазух или рентгенография (34 пациента, 65,4%), были обнаружены изменения в ОНП (синуситы).

Выводы. 1. Заболеваемость острым средним отитом среди детей в исследовании не превышает заболеваемости ОСО в общей популяции (75%).

2. Вопрос изучения строения ЛОР-органов у пациентов с муковисцидозом остаётся актуальным.

3. Необходимо также дальнейшее исследование и усовершенствование методов лечения пациентов с МВ, с целью увеличения продолжительности и улучшения качества их жизни.