

Киптик А. Ю., Гормаш Е. С.

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СИМПТОМОВ ХРОНИЧЕСКОГО ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шляга И. Д.

Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель

Актуальность. С учётом роста заболеваемости раком гортани, ранняя его диагностика становится главным фактором увеличения опухоль-специфической выживаемости – то есть, времени от постановки диагноза до возможного летального исхода. Однако, исходя из знания облигатных предраковых состояний гортани, можно не допустить малигнизацию таких заболеваний, и тем самым, спасти пациента. Главным предраковым состоянием гортани является хронический гиперпластический ларингит. Для врача-оториноларинголога важно знать основные параметры данного заболевания с целью раннего выявления и должного лечения таких пациентов.

Цель: произвести качественную оценку основных симптомов хронического гиперпластического ларингита на примере пациентов с данным заболеванием Добрушского района.

Материалы и методы. Изучалась архивная документация пациентов из Добрушского района с подтвержденным эндоскопически клиническим диагнозом «Хронический гиперпластический ларингит», медицинская научная литература, посвященная данной теме. Использован статистический метод обработки данных.

Результаты и их обсуждение. На момент обработки архивных данных, на диспансерном учете у оториноларинголога с диагнозом хронический гиперпластический ларингит состояли 61 пациент, среди которых 39 мужчин (64%), 22 женщины (36%), средний возраст составил 45,6 лет. 60 пациентов (98%) обратились к врачу самостоятельно, один пациент был направлен на дообследование после профосмотра. Длительность симптомов варьировала от 10 дней до 30 лет, большинство пациентов обращались в первые полгода с начала клиники заболевания. Все пациенты в первую очередь жаловались на изменение голоса – от охриплости вплоть до афонии. При этом, большинство людей с охрипшим голосом было с тяжелой степенью тяжести – 28 из 50 с данным симптомом. Из других симптомов, чаще других встречались: ощущение инородного тела в горле - 55 (90%), кашель 46 (75%), одышка при физической нагрузке 43 (70%), и более редкие симптомы – затруднение при глотании, одышка в покое, боль в горле. Такие симптомы, как дисфония, ощущение кома в горле, кашель и одышка одинаково часто встречаются как при ларингитах, так и при злокачественных новообразованиях гортани, что может быть использовано для назначения дополнительных обследований. При таких симптомах, как боль в горле, затруднении дыхания и одышки в состоянии покоя в совокупности с предыдущими симптомами, следует провести необходимое дообследование для исключения рака гортани.

Выводы. Заболеваемость хроническим гиперпластическим ларингитом, его большая распространенность среди мужчин и людей возрастом в среднем 40-50 лет соответствует данным научной литературы. Основная симптоматика, полученная в ходе анализа архивной документации, является характерной для хронического гиперпластического ларингита. Установлены симптомы, которые одинаково встречаются как при ларингитах, так и при злокачественных заболеваниях гортани. При подозрении на данную патологию следует проводить дообследование с целью как можно более ранней диагностики онкологии, её терапии и увеличения опухоль-специфической выживаемости пациентов.