

*Воропай Е. А. Жагунь О. А.*  
**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ**  
*Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Амельченя О. А.*  
*Кафедра общей хирургии*  
*Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск*

**Актуальность.** Лечение геморроя – это актуальная проблема, т.к. среди заболеваний прямой кишки геморрой и его сочетания с другой патологией анального канала встречается в 18-42% всех клинических наблюдений. Распространенность заболевания составляет 130-145 случаев 1000 взрослого населения, причем женщины и мужчины болеют с одинаковой частотой. В стационарах Республики Беларусь ежегодно оперируется около 2000-2100 пациентов с хроническим геморроем.

**Цель:** изучение качества жизни пациентов после различных способов лечения геморроя.

**Материал и методы.** Изучено 50 медицинских карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в 3 ГКБ им Е.В. Клумова. 25 пациентов лечились методом стандартной геморроидэктомии по Миллигану-Моргану, 25 – методом фотодинамической терапии.

**Выводы.**

1. Результаты исследования актуальны в проктологии при выборе способа лечения геморроя.
2. Установлено, что значения показателей физического и психического здоровья пациентов по опроснику SF-36 через год и два года выше при использовании фотодинамической терапии для лечения геморроя, чем после стандартной геморроидэктомии по Миллигану Моргану.